

疫苗特性 & 注意事項

活性減毒疫苗

- 卡介苗(BCG)
- 小兒麻痺口服疫苗(OPV)
- 麻疹疫苗(MV)
- 麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)
- 水痘疫苗(Var)
- 黃熱病疫苗

不活化疫苗

- B 型肝炎疫苗(rHepB)
- 白喉百日咳破傷風混合(DPT)
- 日本腦炎疫苗(JE)
- 流行性感冒疫苗(Flu)
- 破傷風減量白喉混合(Td)
- 白喉破傷風混合(DT)
- A 型肝炎疫苗(HepA)
- 注射式小兒麻痺疫苗(IPV)
- b 型嗜血桿菌(Hib)
- 肺炎雙球菌疫苗
- 狂犬病
- 霍亂
- 流行性腦脊髓膜炎
- 多合一疫苗

活性→活性

- ⊙ 可同時接種，如不同時接種最少要間隔一個月。
- ⊙ 接受一般肌肉注射免疫球蛋白治療或 HBIG 者，應間隔三個月後再接種 MV、MMR 或 Var 疫苗。
- ⊙ 輸過血(Washed RBCs 除外者)，應間隔六個月後再接種 MV、MMR 或 Var 疫苗。
- ⊙ 曾靜脈注射血漿、血小板製品或靜脈注射高劑量免疫球蛋白治療時，應間隔十一個月後再接種 MV、MMR 或 Var 疫苗。

不活化→不活化

- ⊙ 可同時接種或間隔任何時間接種。
- ⊙ JE 與 DTP 要間隔一個月。

活性→不活化

- ⊙ 可同時接種或間隔任何時間接種。
- ⊙ 霍亂疫苗與黃熱病疫苗應間隔三週以上。

提前接種

- ★ 白喉百日咳破傷風混合、小兒麻痺最早可提前到一個半月時接種。
- ★ 麻疹、MMR、日本腦炎最早可再提前一個月。

接種間隔

- ⊙ B 型肝炎前兩劑間隔至少四週(可容許提前二、三天)，第三劑可提前一個月以內。
- ⊙ 小兒麻痺、白喉百日咳破傷風混合前三劑間隔至少一個月，第四劑與第三劑至少間隔六個月。
- ⊙ 日本腦炎前兩劑間隔兩週不宜再縮短，第三劑與第二劑至少間隔六個月。