

## 登革熱噴藥須知與事後處置

### 一、噴藥前注意事項：

- 1、是使用水性除蟲菊精化合物，就是家用殺蟲劑的加強版，因為人體比蚊蟲大很多，所以毒性影響較低，但是對於體重較輕與幼童可能會有一些影響，噴藥時要離開；另外對於水生動物有毒性，例如魚類，所以要包覆。
- 2、噴灑區域一定是逐層逐戶，且在確診個案方原五十公尺內全噴，包含頂樓到地下室。
- 3、若是無人在家或是單位，衛生單位會帶鎖匠來強制開門噴藥，這是依據傳染病防治法第 38 條授權。
- 4、拒絕或是妨礙噴藥，會被依傳染病防治法第 38 條與 67 條，處 6 萬以上 30 萬元以下罰鍰。
- 5、建議將電腦等精密儀器包覆，但請勿過度包覆，避免斑蚊躲進去，降低防疫成效，更對內部人員帶來染病風險。

### 二、噴藥後注意事項：

- 1、噴完後請保持門窗緊閉至少一小時，才能夠確保成蚊死光。之後在戴口罩(至少要有活性碳)，進入開門開窗。
- 2、若是食物或是飲水直接碰觸藥劑煙霧，請逕行丟棄或倒除，切勿食用，避免中毒。
- 3、本藥劑會自行揮發，可用施布擦拭；若是不擦拭，可維持短暫除蟲的效果。
- 4、請注意地板是否濕滑，避免跌倒。
- 5、依照傳染病防治法第 38 條，公司行號與政府機關應給予公假，如需請假證明，請於噴藥當天洽詢衛生所同仁。

### 三、噴藥與防疫：

- 1、噴藥只能治標不能治本，蚊卵可以乾燥存續一年，遇水就孵化，為因應現在疫情，北區請天天清除或刷洗容器，其他區每三天清理一次，多於容器請盡早丟棄與回收。
- 2、若是你或家人有發燒、頭痛、後眼窩痛或關節痛等症狀，請盡速去衛生所抽血或是一般診所就醫，並說明有無被斑蚊叮咬、或是蚊子很多等細節。
- 3、抽血檢驗結果前請盡可能待在家中，並噴灑殺蟲劑，避免萬一帶有病毒，被斑蚊叮咬而導致疫情擴散。