

「百里酚」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 1 月 27 日農授防字第 1101488173A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
百里酚	thymol	2-isopropyl-5-methylphenol

二、「百里酚」農藥使用方法與範圍一覽表

25% 百里酚 膠劑(GD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蜜蜂	蜂蟹蝨			日均溫攝氏 25-40 度，每蜂箱用藥量 25 克。	7				<ol style="list-style-type: none"> 將藥劑放置於巢箱頂部，開放面朝上。並確認藥盒上方至蜂箱箱蓋至少有 5 毫米的空間，以利蜜蜂通過並接觸凝膠。 藥劑放置至少持續 3 到 6 週，或直到本產品膠體消失為止。 本產品可在一天的任何時間點使用，但在傍晚使用的效果最好。因為此時大多數蜜蜂已歸巢，且氣溫逐漸下降，蜂群活動趨緩，本產品昇華速率較低，蜂群會較快適應百里酚的氣味。 日均溫低於攝氏 15 度或高於攝氏 40 度時，或者蜂群活動度非常低時，請勿使用本產品。 請勿在採蜜期使用本產品，避免影響蜂蜜風味。 	原登廠名稱：威國有限公司