

筆者多以右脅腹大網膜固定術(right-flank omentopexy)治療第四胃異位，其特點包括可用於幾乎所有的病例，優點為牛隻站立進行手術，且不直接縫第四胃上，所需要之人手少，效果甚佳且復發率低(Chuang *et al.*, 2001)。缺點為無法直接看到皺胃、可能有腹膜炎的產生或手術部位的水腫及感染。手術完成後，牛隻雖不會復發左側異位，但仍會發生右側異位。另外偶而也使用Blind tackabomasopexy and toggle-pin abomasopexy，但多用於有經濟考量以及需快速完成之情況下進行，缺點包含：錯過皺胃位置、而將幽門部或是胃體環繞住，皺胃固定在不正確的位置，液體從皺胃腔流入腹腔，刺穿錯誤的臟器，傷害到乳房的靜脈造成靜脈炎，或是來自外源或內源的污染原感染腹腔。

目前對於預防第四胃異位的發生多著重於飼養管理方面，因此對於飼料的給予必須注意增加足量粗料於飼料中；更換飼糧時應以漸進方式進行，避免突然變更造成牛隻緊迫及胃腸不適，而發生第四胃弛緩；乾乳牛日糧中添加陰離子鹽濃度；以及減少牛隻之緊迫，如避免改變牛隻作息、加強通風以散熱、加強牛舍清潔和適當之飼養密度等。

