

陳秋麟教授解析：

目前全省均有新城病與傳染性支氣管炎抗體異常情形；新城病多與CCRD混合感染而造成嚴重死亡，應加強宣導畜牧場自身生物安全措施及影響免疫計畫之免疫抑制疾病如雞傳染性貧血、傳染性華氏囊病、白血病、黴菌毒素感染等之防治。每年入冬因密飼畜舍通風不良問題，皆會使呼吸道疾病感染增加。

南區

1. 高雄市動物衛生檢驗所

該縣主要為觀賞鳥之小型飼養戶，已送檢寵物鳥包括候鳥300件作流感監測，皆為陰性。

2. 高縣動物防疫所

該縣目前水禽疾病多為傳染性漿膜炎及鴨病毒性肝炎；雞為產蛋下降。另外在金剛鸚鵡可能造成人的流感傳播應受重視。

3. 台東縣動物防疫所

該縣流感監測有0.5 %陽性率。12月份呈報ND陽性1場，該場為多年飼養場，發病雞隻約10週齡，呈現咳嗽、神經症狀及綠色便，12天內死亡50 %，剖檢有極典型腸道型新城病病變。

4. 金門縣動植物防疫所

該縣無大型養雞場，僅發生烏鴉因誤食農藥（萬靈）死亡，造成民眾恐慌而通報禽流感疫情之情形。

5. 屏東縣家畜疾病防治所

該縣剖檢病例中以水禽傳染性漿膜炎為多，另有少數球蟲症及麴菌症之病例。雞隻在保溫不佳方面有造成產蛋下降的情形。

