



圖1

▲ 頸部後仰及雙腳後伸，呈後弓反張姿式。



圖2

▲ 罹病雛鴨會發生運動失調、扭頸及下痢等症狀。




圖3

▲ 胸、腹部氣囊及心囊略微增厚混濁，心囊內可見淡黃色心囊液蓄積。



圖4

▲ 肝臟潮黃腫脹，漿膜面可見多發性出血斑。




圖5

▲ 肝被膜可見大量纖維素附著，並可見一肉芽腫及多量異嗜球浸潤，肝實質內可見大量紅血球蓄積。(H&E;100X)




圖6

▲ 門脈區周圍可見淋巴細胞及異嗜球多量浸潤，肝細胞廣泛性空泡樣變性。(H&E;200X)




圖7

▲ 心外膜可見纖維素附著、出血及異嗜球和淋巴球多量浸潤。(H&E;200X)




圖8

▲ 腎臟漿膜面可見纖維素附著、出血及異嗜球和淋巴球多量浸潤。(H&E;200X)




圖9

▲ 腦膜可見多量異嗜球及淋巴球浸潤。(H&E;400X)



圖10

◀ 病鴨之肝脾混合乳劑RT-PCR檢測結果。
M：100 bp ladder marker，Lane 1：11/15雛鴨，Lane 2：11/30雛鴨，Lane 3：12/5雛鴨，PC：陽性對照251 bp產物，NC：陰性對照。