

動物用藥品使用準則第四條附件二修正草案總說明

動物用藥品使用準則於九十四年五月四日發布施行後，歷經十次修正，最近一次修正為一百十一年二月七日。因培可黴素（Bicozamycin）品目已於一百十一年三月一日起停止使用，以及磺胺二甲嘧啶（Sulfamethazine）、歐美德普（Ormethoprim）、磺胺二甲氧嘧啶（Sulfadimethoxine）、磺胺奎林（Sulfaquinoxaline）等四項品目亦將於一百十二年一月一日起停止使用，故一併刪除該等品目之相關內容。另基於預防球蟲感染症需要，增列孟寧素（Monensin）及乃卡巴精（Nicarbazin）合併使用之方式。爰擬具「動物用藥品使用準則」第四條附件二含藥物飼料添加物使用規範修正草案。

動物用藥品使用準則第四條附件二含藥物飼料添加物使用規範修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。	一、成分規格： (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。 (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。	本點未修正。
二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 恩黴素 Enramycin 1.4 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.5 六肽黴素 Nosiheptide 1.6 泰妙素 Tiamulin 1.7 泰黴素 Tylosin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinat 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 沙利黴素 Salinomycin 2.13 仙杜拉素 Semduramicin 2.14 柔林 Zoalene	二、品目： （一）抗菌劑類： 1.1 安痢黴素 Apramycin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） 1.2 阿美拉黴素 Avilamycin 1.3 培可黴素 Bicozamycin （自中華民國一百十一年三月一日起停止使用） 1.4 恩黴素 Enramycin 1.5 富樂黴素 Flavomycin（Bambermycin） 1.6 六肽黴素 Nosiheptide 1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine （自中華民國一百十二年一月一日起停止使用） 1.8 泰妙素 Tiamulin 1.9 泰黴素 Tylosin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） （二）抗寄生蟲劑類： 2.1 安保寧 Amprolium 2.2 氯吡啶 Clopidol 2.3 賽滅淨 Cyromazine 2.4 滴克奎諾 Decoquinat 2.5 戴克拉爾 Diclazuril 2.6 衣索巴 Ethopabate 2.7 拉薩羅 Lasalocid 2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 2.9 孟寧素 Monensin 2.10 那寧素 Narasin 2.11 乃卡巴精 Nicarbazin 2.12 歐美德普 Ormethoprim （自中華民國一百十二年一月一日起停止使用） 2.13 沙利黴素 Salinomycin 2.14 仙杜拉素 Semduramicin 2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine （自中華民國一百十二年一月一日起停止使用） 2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline （自中華民國一百十二年一月一日起停止使用） 2.17 柔林 Zoalene	現行品目 1.3 培可黴素（Bicozamycin）已於一百十一年三月一日起停止使用，品目 1.7 磺胺二甲嘧啶（Sulfamethazine）、2.12 歐美德普（Ormethoprim）、2.15 磺胺二甲氧嘧啶（Sulfadimethoxine）、2.16 磺胺奎林（Sulfaquinoxaline）亦將於一百十二年一月一日起停止使用，爰刪除該等品目相關內容，其餘品目依次遞移。

三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：					一、配合現行規定第二點修正，爰將現行規定 1.3、1.7、2.12、2.15、2.16 刪除其使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項。另因 1.9.3.5 及 2.1.3 之使用方法包含 1.7 磺胺二甲嘧啶及 2.16 磺胺奎林，爰一併刪除該等用法及相關描述內容。				
1.抗菌劑類					1.抗菌劑類					二、基於防治相關疫病需要，增列 2.9 孟寧素（Monensin）與乃卡巴精（Nicarbazin）合併使用之方式，以預防球蟲性疾病。				
本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。					本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。									
1.1 安痢黴素 Apramycin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用）					1.1 安痢黴素 Apramycin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用）									
化 學 名：Apramycin sulfate					化 學 名：Apramycin sulfate									
注意事項：連續使用不可超過 14 日。					注意事項：連續使用不可超過 14 日。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期						
1.1.1	豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。	1.1.1	豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。					
1.2 阿美拉黴素 Avilamycin					1.2 阿美拉黴素 Avilamycin									
化 學 名：Avilamycin					化 學 名：Avilamycin									
注意事項：					注意事項：									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期						
1.2.1	肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。	1.2.1	肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。					
1.2.2	豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。	1.2.2	豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
		1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。			1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
1.3 恩黴素 Enramycin					1.3 培可黴素 Bicozamycin （自中華民國一百十一年三月一日起停止使用）									
化 學 名：Enramycin					化 學 名：Bicozamycin									
注意事項：					注意事項：蛋雞不可使用。									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期						
1.3.1	雞（不包括肉雞）	1.3.1.1 恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。	1.3.1	雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。					
1.3.2	肉雞	1.3.2.1 恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。	1.3.2	豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。					
1.3.3	豬	1.3.3.1 恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。	1.4 恩黴素 Enramycin									
					化 學 名：Enramycin									
					注意事項：									
使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期		使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期						

1.4 富樂黴素 Flavomycin (Bambermycin)					對象物 (ppm)				
化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin					1.4.1 雞 (不包括肉雞)				
注意事項：					恩黴素 1-10 10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。				
使用對象 飼料添加物 用量 (ppm) 用途用法及停藥期					1.4.2 肉雞 1.4.2.1 恩黴素 1-10 促進生長及改進飼料利用效率。				
1.4.1 肉雞 1.4.1.1 富樂黴素 1-2.2 促進生長及改進飼料利用效率。					1.4.3 豬 1.4.3.1 恩黴素 2.5-20 體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。				
1.4.2 豬 1.4.2.1 富樂黴素 2-4.4 與 1.4.1.1 相同。									
1.4.3 牛 1.4.3.1 富樂黴素 1-4.4 與 1.4.1.1 相同。									
1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin)									
化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin									
注意事項：									
使用對象 飼料添加物 用量 (ppm) 用途用法及停藥期									
1.5.1 肉雞 1.5.1.1 富樂黴素 1-2.2 促進生長及改進飼料利用效率。									
1.5.2 豬 1.5.2.1 富樂黴素 2-4.4 與 1.5.1.1 相同。									
1.5.3 牛 1.5.3.1 富樂黴素 1-4.4 與 1.5.1.1 相同。									
1.6 六肽黴素 Nosiheptide									
化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-ω][2,11,21,27,31,7,14,17] benzoxatetrathiazacyclohexatriacontin-2-yl)-4- thiazole-carboxamide									
注意事項：									
使用對象 飼料添加物 用量 (ppm) 用途用法及停藥期									
1.6.1 雞 (不包括肉雞) 1.6.1.1 六肽黴素 2.5-10 10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。									
1.6.2 肉雞 1.6.2.1 六肽黴素 2.5-10 促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。									
1.6.3 豬 1.6.3.1 六肽黴素 2.5-20 促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。									
1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine (自中華民國一百一十二年一月一日起停止使用)									
化 學 名：N ¹ -(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl) sulfanilamide									

1.7 泰黴素 Tylosin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） 化 學 名：Tylosin phosphate 注意事項：						<u>注意事項：參照泰黴素（1.9.3.5）合併使用，不可單獨使用。</u>					
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期						
1.7.1	雞	1.7.1.1	泰黴素	4.4-55	促進生長及改進飼料利用效率。						
1.7.2	蛋雞	1.7.2.1	泰黴素	22-55	改進飼料利用效率。						
1.7.3	豬	1.7.3.1	泰黴素	100-110	預防豬赤痢，100-110ppm 連續餵飼 3						
				44	週後，改用 44ppm 至出售。						
		1.7.3.2	泰黴素	11-22	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。						
		1.7.3.3	泰黴素	22-44	體重 30-60kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。						
1.7.3.4	泰黴素	22-110	體重 10-30kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。								
2.抗寄生蟲劑類 本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。											
2.1 安保寧 Amprolium 化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride 注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。											
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期						
2.1.1	肉雞	2.1.1.1	安保寧	80-250	預防球蟲病。						
	新母雞	2.1.1.2	安保寧	40-250	預防球蟲病。						
	蛋雞	2.1.1.3	安保寧	125	預防球蟲病。						
2.1.2	雞	2.1.2.1	安保寧加衣索巴	125-250 4	預防球蟲病。						
2.2 氯吡啶 Clopidol 化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol											

1.8 泰妙素 Tiamulin 化 學 名：14-Desoxy-14-[(2-diethylaminoethyl) mercaptoacetoxy] mutilin hydrogen fumarate 注意事項：1.不可使用於體重超過 114 公斤（250 磅）的豬隻。 2.不可與離子型球蟲藥（如 Monensin、Narasin 及 Salinomycin 等）合併使用。 3.豬以外動物不可使用。						
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期	
1.8.1	豬	1.8.1.1	泰妙素	11	促進生長及提高飼料利用效率。	
		1.8.1.2	泰妙素	22-38.5	控制豬赤痢，停藥期 2 日。	
1.9 泰黴素 Tylosin （自中華民國一百十三年一月一日起停止使用） 化 學 名：Tylosin phosphate 注意事項：						
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）	用途用法及停藥期	
1.9.1	雞	1.9.1.1	泰黴素	4.4-55	促進生長及改進飼料利用效率。	
1.9.2	蛋雞	1.9.2.1	泰黴素	22-55	改進飼料利用效率。	
1.9.3	豬	1.9.3.1	泰黴素	100-110	預防豬赤痢，100-110ppm 連續餵飼 3	
				44	週後，改用 44ppm 至出售。	
		1.9.3.2	泰黴素	11-22	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。	
		1.9.3.3	泰黴素	22-44	體重 30-60kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。	
		1.9.3.4	泰黴素	22-110	體重 10-30kg 使用，促進生長及改進飼料利用效率。	
1.9.3.5	泰黴素加磺胺二甲噻啶	44-110 44-110	<u>體重 60kg 以下使用，預防豬赤痢，控制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎時，維持增重及飼料利用效率。停藥期 15 日。</u>			
2.抗寄生蟲劑類 本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。						

注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.2.1	肉雞及新母雞	2.2.1. 氯吡啶 1	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。
2.3 賽滅淨 Cyromazine 化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 注意事項：肉雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.3.1	蛋雞及種雞	2.3.1. 賽滅淨 1	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用 4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼蠅棲群增加時可重複使用。
2.4 滴克奎諾 Decoquinate 化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate 注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.4.1	肉雞 1	2.4.1. 滴克奎諾	30	預防球蟲病。
2.5 戴克拉爾 Diclazuril 化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile 注意事項：蛋雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.5.1	肉雞	2.5.1.1 戴克拉爾	1	預防球蟲病，停藥期 5 日
2.6 衣索巴 Ethopabate 化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate 注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。				
2.1 安保寧 Amprolium 化 學 名：1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride 注意事項：安保寧加衣索巴加磺胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.1.1	肉雞新母雞	2.1.1.1 安保寧 2.1.1.2 安保寧	80-250 40-250	預防球蟲病。 預防球蟲病。
	蛋雞	2.1.1.3 安保寧	125	預防球蟲病。
2.1.2	雞	2.1.2.1 安保寧加衣索巴	125-250 4	預防球蟲病。
2.1.3	雞	2.1.3.1 安保寧加衣索巴加磺胺奎林	100 5 60	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 10 日。
2.2 氯吡啶 Clopidol 化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol 注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.2.1	肉雞及新母雞	2.2.1. 氯吡啶 1	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病，停藥期 5 日。
2.3 賽滅淨 Cyromazine 化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 注意事項：肉雞不可使用。				
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）	用途用法及停藥期
2.3.1	蛋雞及種雞	2.3.1. 賽滅淨 1	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用 4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼蠅棲群增加時可重複使用。

2.7 拉薩羅 Lasalocid 化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。				2.4 滴克奎諾 Decoquate 化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate 注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。			
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）			用途用法及停藥期	
2.7.1	肉雞	2.7.1.1 拉薩羅	75-125		預防球蟲病。		
	或更 新母 雞						
2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。				2.5 戴克拉爾 Diclazuril 化 學 名：(±)2,6-dichloro- α -(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile 注意事項：蛋雞不可使用。			
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）			用途用法及停藥期	
2.8.1	肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素	5-7		預防球蟲病，停藥期 5 日。		
		2.8.1.2 馬杜拉黴素 加 乃卡巴精	3.75-4.125 40-44		與 2.8.1.1 相同。		
2.9 孟寧素 Monensin 化 學 名：Monensin sodium 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.16 週齡以上之雞不可使用。 3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。 4.馬或馬屬動物不可使用。 5. <u>孟寧素與乃卡巴精合併使用時，不可連續使用超過 6 週。</u>				2.6 衣索巴 Ethopabate 化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate 注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可單獨使用。			
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）			用途用法及停藥期	
2.9.1	雞	2.9.1.1 孟寧素	100-120		預防球蟲病。		
	<u>肉雞</u> <u>及新</u> <u>母雞</u> <u>及火</u>	<u>2.9.1.2 孟寧素</u> <u>加</u> <u>乃卡巴精</u>	<u>40-50</u> <u>40-50</u>		<u>預防球蟲病。</u>		
2.7 拉薩羅 Lasalocid 化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。				2.7 拉薩羅 Lasalocid 化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran-2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。			
	使用對象	飼料添加物	用量（ppm）			用途用法及停藥期	
2.7.1	肉雞	2.7.1.1 拉薩羅	75-125		預防球蟲病。		
	或更 新母 雞						
2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。				2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin 化 學 名：Maduramicin ammonium 注意事項：1.蛋雞不可使用。 2.使用於雞以外的動物，可能會引起危險。 3.本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。			

<u>雞</u>				使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.10 那寧素 Narasin				2.8.1 肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素	5-7	預防球蟲病，停藥期 5 日。
化 學 名：Narasin					2.8.1.2 馬杜拉黴素	3.75-4.125	與 2.8.1.1 相同。
注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。					加		
2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。					乃卡巴精	40-44	
3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。							
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	2.9 孟寧素 Monensin			
2.10.1 雞				化 學 名：Monensin sodium			
2.10.1.1				注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。			
2.10.1.2				2.16 週齡以上之雞不可使用。			
2.10.1.2				3.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。			
2.10.1.2				4.馬或馬屬動物不可使用。			
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	2.9.1 雞			
2.10.1.1				2.9.1.1 孟寧素			
2.10.1.1				100-120 預防球蟲病。			
2.10.1.1				2.10 那寧素 Narasin			
2.10.1.1				化 學 名：Narasin			
2.10.1.1				注意事項：1.兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。			
2.10.1.1				2.本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。			
2.10.1.1				3.那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。			
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	2.10.1 雞			
2.11.1 雞				2.10.1.1 那寧素			
2.11.1.1				60-80 預防球蟲病。			
2.11.1.1				2.10.1.1 那寧素			
2.11.1.1				30-50 預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.11.1.1				2 加			
2.11.1.1				乃卡巴精			
2.11.1.1				30-50			
2.11 乃卡巴精 Nicarbazin				2.10.1 雞			
化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine				2.10.1.1 那寧素			
注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。				60-80 預防球蟲病。			
使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期	2.10.1.1 那寧素			
2.11.1 雞				30-50 預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.11.1.1				2 加			
2.11.1.1				乃卡巴精			
2.11.1.1				30-50			
2.12 沙利黴素 Salinomycin				2.11 乃卡巴精 Nicarbazin			
化 學 名：Sodium salinomycin				化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine			
注意事項：1.本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。				注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。			
2.產蛋中之蛋雞不可使用。				使用對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.12.1 雞(不包				2.11.1 雞			
2.12.1.1				2.11.1.1 乃卡巴精			
2.12.1.1				100-200 預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.12.1.1				1 加			
2.12.1.1				乃卡巴精			
2.12.1.1				100-200 預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.12.2 肉雞				2.11.1.1 乃卡巴精			
2.12.2.1				100-200 預防球蟲病，停藥期 5 日。			
2.12.2.1				2.11.1.1 乃卡巴精			
2.12.2.1				100-200 預防球蟲病，停藥期 5 日。			

2.13 仙杜拉素 Semduramicin				2 加			
化 學 名：Semduramicin salt sodium				衣索巴 4-8			
注意事項：產蛋雞不可使用							
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）		用途用法及停藥期	
2.13.1 肉雞		2.13.1.1 仙杜拉素		25		預防球蟲病。	
2.14 柔林 Zoalene							
化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide							
注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。							
2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。							
使用對象		飼料添加物		用量（ppm）		用途用法及停藥期	
2.14.1 雞		2.14.1.1 柔林		40-125		預防球蟲病。	
1							

	<u>注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。</u>			
	<u>使用對象</u>	<u>飼料添加物</u>	<u>用量</u> (ppm)	<u>用途用法及停藥期</u>
	2.16.1 雞	2.16.1. 磺胺奎林	150-250	預防球蟲病，停藥期 10 日。
	1			
	2.17 柔林 Zoalene 化 學 名：3,5-Dinitro-o-toluamide 注意事項：1.產蛋中之蛋雞不可使用。 2.應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。			
	<u>使用對象</u>	<u>飼料添加物</u>	<u>用量</u> (ppm)	<u>用途用法及停藥期</u>
	2.17.1 雞	2.17.1. 柔林	40-125	預防球蟲病。
	1			