

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所

函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號
承辦人：蘇慶昌
電話：(08)7392111~3
傳真：(08)7390595
E-mail：succcc@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國 104 年 7 月 17 日
發文字號：(104)台蕉研發字第 2627 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

總收文



1040094184



主旨：蕉株抽穗期間，務必加強宣導蕉農適時做好花薊馬防治作業，俾確保生產外觀優良品質香蕉，請 查照。

說明：

- 一、香蕉花薊馬蟲口整年均可發現，蕉株抽穗期間如疏忽花薊馬防治，花薊馬易侵入花苞產卵，危害香蕉幼果果皮，造成果皮外表發生水銹斑。請蕉農於蕉株抽穗時期，把握正確防治時機及時進行香蕉花薊馬防治。
- 二、防治方法：每 3~5 天巡視蕉園 1 次，在花苞即將抽出莖頂或初彎下時，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - (一)、以 2.8 % 第滅寧乳劑 3,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - (二)、5 % 陶斯松粒劑或 10 % 福瑞松粒劑：每株 15 公克，分別撒施於第 1、2 葉鞘內，並於終花期前以 2.8 % 第滅寧乳劑 3,000 倍液噴果房 1 次。
 - (三)、終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - (四)、定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散。



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

所長 趙治平