

檔號：

保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號

承辦人：蘇慶昌

電話：(08)7392111~3

傳真：(08)7390595

E-mail：succccc@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國 104 年 7 月 9 日

發文字號：(104)台蕉研發字第 2629 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

總收文



1040094044



主旨：籲請產銷業者宣導所屬轄區蕉農確實做好開花蕉株果房疏果、整梳、套袋及蕉園排水工作，俾確保採收果品之優良品質，請查照。

說明：

- 一、蕉株生育期間需適時進行病蟲害防治，做好蕉葉保護，以利未來蕉果之正常生長。
- 二、目前疏果整梳及套袋對象，為高屏及嘉義地區六月底以前開花之蕉株，(其他地區約延長一~三週)，即稱之夏蕉(大頭、大臍、尖尾)。務必做好果房疏果、整梳及套袋工作。
- 三、疏果、整梳方法：
 - (一)、於香蕉終花前，果把果指與地面水平時期，分二~三次摘除蕉花，以減少蕉乳污染，並同時進行疏果、整梳作業。
 - (二)、獅頭蕉、三層蕉、生長不整齊及果指數不足 16 指之果手，均應整把切除。
 - (三)、依蕉株發育情形選留適當果手數(七至九把)，以一片健葉留一果手為原則。

(四)、果指向上彎曲時，在果手外輪果指層套用小型塑膠隔層袋(一果房約分二~三次套袋)，以避免生育中蕉指相互擦傷果皮。

(五)、每一果手之果指數以 16~20 指為原則，過多或排列不整之果指應摘除。每一果手中摘指數不宜超過 2 指。

(六)、最後一次果指套用隔層袋時，同時套用褐色牛皮紙袋，且依不同旬別，在果房下端繫上色帶，作為採收時期之依據。

四、加強蕉園排水：梅雨季節有時帶來豪大雨，部份較低窪蕉園若有積水情形，應儘速設法排水，促進新根發育，恢復蕉株生機。



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

所長 趙 治 平