

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所

函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號
承辦人：蘇慶昌
電話：(08)7392111~3
傳真：(08)7390595
E-mail：succcc@yahoo.com.tw

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國 104 年 7 月 17 日
發文字號：(104)台蕉研發字第 2628 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

總收文



1040094190



主旨：籲請蕉農注意香蕉葉部病害防治作業，俾確保蕉株良好發育、蕉果品質及產量，請查照。

說明：

一、近日來氣候時雨時晴，適合香蕉葉部病原菌(黑星病及葉斑病為主)傳播及蔓延擴散。中株期或已進入抽穗期蕉株，噴藥前宜先清園並割除下方嚴重受害之病葉，以減少感染源。進入終花期之果串，需先將果房適當整梳後，再行套袋。套袋後，需將套袋拉直，並避免套袋頂端因形成凹槽，造成雨水蓄集於套袋上方，引發套袋破裂及果房遭受黑星病菌感染，而對蕉果品質，有極大之影響。

二、噴藥方式及藥劑配方如下列(可任選一種)：

(一)、使用肩背式微粒動力噴霧機：

每公頃 80 % 鋅錳乃浦可濕性粉劑 2.5 公斤+出來通 72 公撮，加水至 30 公升。新植未抽穗蕉園使用 25 % 普克利乳劑每公頃 0.4 公升，加水至 30 公升或 206.7g/L 凡殺護矽得乳劑，每公頃 0.5 公升，加水至 30 公升或 23 % 亞托敏水懸劑，每公頃 0.4 公升，加水至 30 公升。

(二)、使用配置落地式捲軸噴藥管之動力噴霧機或自走式噴藥車：藥劑種類同前，惟 80 % 鋅錳乃浦可濕性粉劑濃度調 100-250 倍，另其他三種系統性藥劑濃度調 1,000-2,000 倍。

(三)、其他防治藥劑及施藥配方，請參考植物保護手冊選用。

三、噴藥作業時，須做好安全措施，全程戴帽、戴口罩及穿長袖衣、長褲，避免皮膚接觸藥液，並將藥液儘量噴至葉片上方。



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

所長趙治平