

「布芬淨」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 29 日農授防字第 1101490387C 號公告修正

40% 布芬淨 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.48 公升	2,500	孕穗末期若蟲發生盛期				15	1. 本劑對若蟲防治效果較佳。 2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。	
水稻	斑飛蟲	0.5 公升	加水至 15 公升	一期作插秧後 40-50 天			1. 空中施藥：每 8 平方公分相紙內應有直徑 1000 μ 以下之藥點 135 點以上。 2. 人力噴藥：稀釋 2000 倍，每穗 1-2 隻斑飛蟲時	15	避免南瓜田使用，以免藥害。	
花椰菜	銀葉粉蝨	0.67-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥		2		15		
小葉菜	粉蝨類	0.6-0.9 公	2,500	害蟲發	7	2		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
類		升		生時開 始施藥						
芥藍	銀葉粉 蝨	0.6-0.9 公 升	2,500	害蟲發 生時開 始施藥	7	2		6		
瓜菜類	粉蝨類	0.67-1.13 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7	共 2 次		7	本藥劑使用 範圍：瓜菜類 粉蝨類(胡瓜 除外)	本項修 正。
瓜果類	粉蝨類	0.67-1.13 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7			15		
瓜果類	銀葉粉 蝨	0.67-1.13 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7			15		
檬果	葉蟬類		1,200	抽穗及 開花期 害蟲發 生時開 始施藥	10			15	為保護授粉 昆蟲及天 敵，盛花期避 免施藥。	
檬果	檬果木 蝨	0.38-0.81 公升	1,200	害蟲發 生時開 始施藥	7			15		
梨	梨木蝨	0.96 公升	2,500	害蟲發 生時開 始施藥	7	2		9		
鼠李科 梨果類	粉介殼 蟲類	0.6-0.8 公 升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次				6		
柑桔類	盾介殼 蟲類	1-1.5 公升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次				18		
花木	粉蝨類	0.4-0.8 公 升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7				限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
									試。	
花木	銀葉粉 蝨		1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7		應噴到葉背		限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試	
菊	粉蝨類	0.2-0.8 公 升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7		藥液應噴到 葉背	12		
菊	溫室粉 蝨	0.4-0.8 公 升	1,500	發現葉 片有溫 室粉蝨 時開始 施藥	7		藥液應噴到 葉背			
茶	柑桔刺 粉蝨	0.5 公升	2,000	若蟲發 生初期 施藥				15		
咖啡	軟介殼 蟲類	0.5-1 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施藥	7			7		

25% 布芬淨 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蝨	0.8 公斤	1,500	孕穗末 期若蟲 發生盛 期。				15	1. 本劑對 若蟲防 治效果 較佳。 2. 宜於水 稻孕穗 末期若 蟲發生 盛期使 用一	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
									次。 3. 本劑試驗時加「新利農」展著劑3,000倍。	
水稻	斑飛蟲	0.8 公斤	1,500	孕穗期後若蟲發生高時。			孕穗期後若蟲發生密度高時施藥一次。	15	本劑試驗時加「新利農展著劑」3,000倍。	
花椰菜	銀葉粉蟲	1-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。		2		15		
芥藍	銀葉粉蟲	1-1.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蟲類	1-1.7 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7	本藥劑使用範圍：瓜菜類粉蟲類(胡瓜除外)	本項修正。
瓜果類	粉蟲類	1-1.7 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
瓜果類	銀葉粉蟲	1-1.7 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
檬果	葉蟬類		750	抽穗及開花期害蟲發生時開始施	10			15	1. 為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
				藥。					施藥。 2. 本劑試驗時加展著劑「新利農」3,000倍。	
檬果	檬果木 蝨	0.6-1.3 公 斤	750	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
梨	梨木蝨	1.6 公斤	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		9		
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
花木	銀葉粉 蝨		1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		應噴到葉背。		限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
菊	粉蝨類	0.3-1.2 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		藥液應噴到 葉背。	12		
菊	溫室粉 蝨	0.6-1.2 公 斤	1,000	發現葉 片有溫 室粉蝨 時開始 施藥。	7		藥液應噴到 葉背。			
咖啡	軟介殼	0.7-1.5 公	1,000	害蟲發	7			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
	蟲類	斤		生時開 始施 藥。						