

「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 29 日農授防字第 1101490387D 號公告修正

9. 6%氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次。				15		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始				12		本項新增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥，共 1 次。						

100 G/L (10% W/V) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥	7			6		
瓜果類	二點葉 蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥	7			6		
茶	捲葉蛾 類	0.5 公升	2,000	害蟲發生 時施藥 1 次				15		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75	2,000	害蟬發生				12		本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		<u>公升</u>		<u>初期(當</u> <u>葉蟬每葉</u> <u>達 3-5</u> <u>隻)開始</u> <u>施藥，共</u> <u>1 次。</u>						增。