

「佈飛松」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 3 月 30 日農授防字第 1111488559A 號公告修正

43 (%) (w/w)佈飛松 乳劑 (EC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
小葉菜 類、包 葉菜 類、瓜 果類、 瓜菜 類、豆 菜類、 果菜 類、根 菜類、	斑潛蠅 類	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7-15		本 項 修 正。
落花 生、綠 豆、紅 豆、大 豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆	斑潛蠅 類	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7-15	<u>適用於乾 豆。</u>	
落花 生、綠 豆、紅 豆、大 豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。 <u>適用 於乾豆。</u>	本 項 修 正。
豆科乾 豆類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	使用範圍： 豆科乾豆類 (紅豆除外) 薊馬類	重 複 範 圍，本項 刪除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
落花 生、綠 豆、紅 豆、大 豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 3次		10	適用於乾 豆。	本 項 修 正。
胡麻	薊馬類	0.5- 1.5 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.5- 1.0 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
菊科包 葉菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免開花時 使用。	
薤菜	象鼻蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12		
薤菜	金花蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12		重 複 範 圍，本項 刪除。
薤菜	金花蟲 類	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12		
甘藷	象鼻蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12	限用於葉用 甘藷。	
甘藷	金花蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12	限用於葉用 甘藷。	
豆科小	薊馬類	0.6-1	800	害蟲發生	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施藥。						
豆科小葉菜類	薊馬類	0.6-1公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			4		重複範圍，本項刪除。
豌豆	夜蛾類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於葉用豌豆，避免與石灰硫磺劑混合使用。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.5-1.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
十字花科小葉菜類	黃條葉蚤	0.8-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
青江菜	黃條葉蚤	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	5			10		
菊科小葉菜類	薊馬類	1.5-2.0公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免開花時使用。	
茄科小葉菜類	薊馬類	0.6-2.5公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
蔥科小葉菜類	薊馬類	1-2.5公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
蔥科小葉菜類	薊馬類	1.5-2.0公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥科小葉菜類	根蟎類	3.0-4.5公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
蔥科小葉菜類	根蟎類	3.0-5.0公升	1,000	定植後45日內，發現				15		重複範圍，本項刪除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				根蟎危害 時，灌施 作物基部 1次。						
蔥	根蟎類	3.0- 5.0 公 升	1,000	青蔥定植 後 45 日 內，發現 根蟎危害 時施藥 1 次。				15		
韭	根蟎類	1 公升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
葫蘆科 小葉菜 類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
竹	象鼻蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	象鼻蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	金花蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
豆科根 菜類	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。	
豆科根 菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		重 複 範 圍，本項 刪除。
豆科根 菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
山藥	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
山藥	根蟎類	3.0-4.5 公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
十字花科根菜類	小菜蛾	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
十字花科根菜類	黃條葉蚤	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免開花時使用。	
茄科根菜類	薊馬類	0.6-2.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
蔥科根菜類	薊馬類	1-2.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
蔥科根菜類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥科根菜類	根蟎類	3.0-4.5 公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
蔥科根菜類	根蟎類	3.0-5.0 公升	1,000	定植後45日內，發現根蟎危害時，灌施作物基部1次。				15		重複範圍，本項刪除。
薑	玉米螟	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蘆筍	金花蟲類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄科果菜類	薊馬類	0.6-2.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
金針	根蟎類	3.0-4.5 公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
秋葵	薊馬類	0.6-2.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
瓜菜類	金花蟲類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
瓜菜類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。			必要時隔7天施藥一次。	10		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
豆菜類	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免與石灰硫磺劑混合使用。	
豆菜類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10	禁止使用於豆苗。	重複範圍，本項刪除。
豆菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
豆科豆菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
瓜果類	金花蟲類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
瓜果類	薊馬類	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時開始施藥。			必要時隔7天施藥一次。	10		重複範圍，本項刪除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
							次。			
西瓜	南黃薊 馬	1.5-2 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		本 項 修 正。
瓜果類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
柑桔類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	於花落後 幼果期害 蟲發生時 開始施 藥。	7			21		
花木	根蟎類	1.0- 2.5 公 升	1,000	定植後 3 週灌施基 部。	7	最多 2 次			限球根花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	薊馬類	0.3- 1.3 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
百合	根蟎類		2,000	百合種球 儲藏前或 種植前浸 漬藥液 30 分 鐘。						
百合	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
唐菖蒲	根蟎類		4,000	貯藏或種 植前。					浸種球 30 分鐘。	
唐菖蒲	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	種植後。		2-3	經 20 天 連續行 土壤施 藥二至 三次。			
風茹	薊馬類	0.3-	800	害蟲發生	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		1.3 公 升		時開始施 藥。						
棉	夜蛾類	中期 1- 2 公升 後 1.2- 1.5 公 升	1,000	生長中後 期施藥。						

500 G/L (50% W/V)佈飛松 乳劑(EC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
小葉菜 類、包 葉菜 類、瓜 果類、 瓜菜 類、豆 菜類、 果菜 類、根 菜類	斑潛蠅 類	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7-15		本 項 修 正。
落花 生、綠 豆、紅 豆、大 豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆	斑潛蠅 類	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7-15	<u>適用於乾 豆。</u>	
落花 生、綠 豆、紅 豆、大	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。 <u>適用 於乾豆。</u>	本 項 修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆										
豆科乾 豆類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	使用範圍： 豆科乾豆類 (紅豆除外) 薊馬類	重 複 範 圍，本項 刪除。
落花 生、綠 豆、紅 豆、大 豆、花 豆、樹 豆、蠶 豆、豇 豆	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 3 次		10	適用於乾 豆。	本 項 修 正。
胡麻	薊馬類	0.5- 1.5 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.5- 1.0 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
菊科包 葉菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免開花時 使用。	
薤菜	象鼻蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12		
薤菜	金花蟲 類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		12		重 複 範 圍，本項 刪除。
薤菜	金花蟲	1-1.2	1,000	害蟲發生	7	3		12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	類	公升		時開始施藥。						
甘藷	象鼻蟲類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	3		12	限用於葉用甘藷。	
甘藷	金花蟲類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	3		12	限用於葉用甘藷。	
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施藥。	7			7		
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施藥。	7			4		重複範圍，本項刪除。
豌豆	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			7	適用於葉用豌豆，避免與石灰硫磺劑混合使用。	
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	0.5- 1.0 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			10		
十字花 科小葉 菜類	黃條葉 蚤	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			10		
青江菜	黃條葉 蚤	1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	5			10		
菊科小 葉菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施藥。	7			10	避免開花時使用。	
茄科小 葉菜類	薊馬類	0.6- 2.5 公 升	800	害蟲發生 時開始施藥。	7			10		
蔥科小 葉菜類	薊馬類	1-2.5 公升	800	害蟲發生 時開始施藥。	7			15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔥科小 葉菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		重 複 範 圍，本項 刪除。
蔥科小 葉菜類	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
蔥科小 葉菜類	根蟎類	3.0- 5.0 公 升	1,000	定植後 45 日 內，發現 根蟎危害 時，灌施 作物基部 1 次。				15		重 複 範 圍，本項 刪除。
蔥	根蟎類	3.0- 5.0 公 升	1,000	青蔥定植 後 45 日 內，發現 根蟎危害 時施藥 1 次。				15		
韭	根蟎類	1 公升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
竹	象鼻蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	象鼻蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	金花蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
豆科根 菜類	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。	
豆科根 菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		重 複 範 圍，本項 刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科根菜類	薊馬類	0.6-1公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
山藥	薊馬類	1.5-2.0公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
山藥	根蟻類	3.0-4.5公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
十字花科根菜類	小菜蛾	0.5-1.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
十字花科根菜類	黃條葉蚤	0.8-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	薊馬類	1.5-2.0公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免開花時使用。	
茄科根菜類	薊馬類	0.6-2.5公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
蔥科根菜類	薊馬類	1-2.5公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
蔥科根菜類	薊馬類	1.5-2.0公升	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥科根菜類	根蟻類	3.0-4.5公升	1,000	作物定植後灌注植株基部。	7			15		
蔥科根菜類	根蟻類	3.0-5.0公升	1,000	定植後45日內，發現根蟻危害時，灌施作物基部1次。				15		重複範圍，本項刪除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
薑	玉米螟	1.0- 1.2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
蘆筍	金花蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科果 菜類	薊馬類	0.6- 2.5 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
金針	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
秋葵	薊馬類	0.6- 2.5 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
瓜菜類	金花蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
瓜菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
豆菜類	夜蛾類	0.5- 0.8 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免與石灰 硫磺劑混合 使用。	
豆菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
豆菜類	薊馬類	1.5- 2.0 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	禁止使用於 豆苗。	重複範圍，本項 刪除。
豆科豆 菜類	薊馬類	0.6-1 公升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		重複範圍，本項 刪除。
瓜果類	金花蟲 類	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
瓜果類	薊馬類	1.5-2	800	害蟲發生	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
花木	根蟎類	1.0- 2.5 公 升	1,000	定植後 3 週灌施基 部。	7	最多 2 次			限球根花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
百合	根蟎類		2,000	百合種球 儲藏前或 種植前浸 漬藥液 30 分 鐘。						
百合	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	作物定植 後灌注植 株基部。	7			15		
唐菖蒲	根蟎類		4,000	貯藏或種 植前。					浸種球 30 分鐘。	
唐菖蒲	根蟎類	3.0- 4.5 公 升	1,000	種植後。		2-3	經 20 天 連續行 土壤施 藥二至 三次。			
棉	夜蛾類	中期 1- 2 公升 後 1.2- 1.5 公 升	1,000	生長中後 期施藥。						
<u>葫蘆科 小葉菜 類</u>	<u>薊馬類</u>	<u>1.5- 2.0 公 升</u>	<u>800</u>	<u>害蟲發生 時開始施 藥。</u>	<u>7</u>			<u>10</u>		本項新 增。
<u>柑桔類</u>	<u>薊馬類</u>	<u>1.5- 2.0 公 升</u>	<u>800</u>	<u>於花落後 幼果期害 蟲發生時 開始施 藥。</u>	<u>7</u>			<u>21</u>		本項新 增。
<u>菊</u>	<u>薊馬類</u>	<u>0.3-</u>	<u>800</u>	<u>害蟲發生</u>	<u>7</u>			<u>21</u>		本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		1.3 公 升		時開始施 藥。						增。
風茹	薊馬類	0.3- 1.3 公 升	800	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		本項新 增。