

「賜滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 22 日農授防字第 1111488695A 號公告修正

240 G/L (24% W/V) 賜滅芬 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
仙草	葉蟬類	0.35- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				21		
茄科果 菜類	葉蟬類	0.3-0.4 公升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。				4		
香蕉	葉蟬類	0.14- 0.45 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
木瓜	葉蟬類	0.25- 1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7	施用時須注意避 免幼嫩葉片接觸 過量藥劑。	
番荔枝	葉蟬類	0.35- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
酪梨	葉蟬類	0.5-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
百香果	葉蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
草莓	葉蟬類	0.6-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
葡萄	葉蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
楊桃	葉蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
番石榴	葉蟬類	0.6-1 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
龍眼	葉蟬類	0.38-	2,000	害蟬發生時				7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
		0.75 公 升		施藥 1 次。						
荔枝	葉蟬類	0.3- 0.6 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
檬果	葉蟬類	0.45- 1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
薔薇科 梨果類	葉蟬類	0.5 公升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。	14			7		
印度棗	葉蟬類	0.4 - 0.6 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			7		
柑桔類	葉蟬類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				14		
菊	葉蟬類	0.45- 0.6 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				21		
茶	葉蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			21	適用於茶葉。	
風茹	葉蟬類	0.45- 0.6 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				21		
當歸	葉蟬類	0.6-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				21		
瓜菜類	葉蟬類	0.4-1 公 升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。				3		本項 新增
瓜果類	葉蟬類	0.4-1 公 升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。				3		本項 新增