

「美氟綜」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 3 日農授防字第 1111488747A 號公告修正

22(%) 美氟綜 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於乾豆。	
十字花科包葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		18		
十字花科小葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		9		
番茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
甜椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
辣椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
茄子	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	適用於毛豆。	
花木	夜蛾類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
茶	捲葉蛾類	0.75 公升	1,500	害蟲發生時施藥。				21		
枸杞	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
香瓜茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
樹番茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。

