

「亞滅培」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 2 月 10 日農授防字第 1111488220A 號公告修正

20% 亞滅培 水溶性粉劑 (SP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
臺灣藜	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			28		
落花生 綠豆 紅豆 大豆 花豆 樹豆 蠶豆 豇豆	薊馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	適用於乾豆。	本項修 正。
油菜	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	適用於油菜 籽。	
茶	薊馬類	0.3-0.8 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	適用於茶籽。	
油茶	薊馬類	0.3-0.8 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
胡麻	蚜蟲類	0.1-0.2 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
十字花 科包葉 菜類	粉蝨類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	避免使用於 白菜幼苗，以 免發生藥害。	
十字花 科包葉 菜類	蚜蟲類	0.15-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	0.5-0.6 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
結球葛	粉蝨類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生	7			12		本項修

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
苴		斤		時開始施 藥。						正。
結球莴 苴	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		本項修 正。
結球莴 苴	薊馬類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		本項修 正。
薺菜	粉蟲類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薺菜	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薺菜	象鼻蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
薺菜	金花蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
甘藷	粉蟲類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 甘藷。	本項修 正。
甘藷	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 甘藷。	本項修 正。
甘藷	象鼻蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 甘藷。	本項修 正。
甘藷	金花蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 甘藷。	本項修 正。
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豌豆	葉部薊 馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施	7			9	適用於葉用 豌豆。	本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
十字花 科小葉 菜類	粉蟲類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免使用於 白菜幼苗，以 免發生藥害。	
十字花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.15-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科小葉 菜類	黃條葉 蚤	0.5-0.6 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
不結球 萵苣與 半結球 萵苣、 茼蒿、 山萵 蒿、紅 鳳菜、 白鳳 菜、芳 香萬壽 菊、闊 包菊	粉蟲類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本項修 正。
不結球 萵苣與 半結球 萵苣、 茼蒿、 山萵 蒿、紅 鳳菜、 白鳳 菜、芳 香萬壽 菊、闊 包菊	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本項修 正。
不結球	薊馬類	0.1-0.3 公	4000	害蟲發生	7			6		本項修

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
萵苣與 半結球 萵苣、 茼蒿、 山萵 蒿、紅 鳳菜、 白鳳 菜、芳 香萬壽 菊、闊 包菊		斤		時開始施藥。						正。
枸杞	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於枸杞 葉	
龍鬚菜	葉部 薊 馬類	0.2-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免苗期使 用。	本項修 正。
芹菜	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
芫荽	蚜蟲類	0.04-0.5 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
羅勒	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
紫蘇	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
仙草	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
薄荷	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
菠菜	粉蟲類	0.1-0.3 公	4,000	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		斤		時開始施藥。						
菠菜	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			9		
甜菜	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			9	適用於葉用甜菜。	
莧菜	蚜蟲類	0.05-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
茭白筍	長綠飛 蟲	0.4-0.6 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施藥。	7	2		3		
竹	蚜蟲類	0.05-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		
甘藷	蚜蟲類	0.1-1.5 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	適用於甘藷塊根。	
甘藷	象鼻蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	<u>適用於甘藷塊根。</u>	本項修正。
甘藷	金花蟲 類	0.1-0.5 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	<u>適用於甘藷塊根。</u>	本項修正。
<u>豆薯</u> <u>狗尾草</u> <u>闊葉大</u> <u>豆</u>	薊馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		本項修正。
<u>豆薯</u> <u>狗尾草</u> <u>闊葉大</u> <u>豆</u>	葉部薊 馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		本項修正。
山藥	薊馬類	0.3-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
山葵 蕪菁 蘿蔔	黃條葉蚤	0.5-0.6 公 斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		本項修 正。
蘿蔔	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蕪菁	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
山葵	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
牛蒡	薊馬類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		本項修 正。
牛蒡	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
馬鈴薯	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	設施栽培 12 天停止施藥。	
蒜	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於蒜頭	
洋蔥	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
落葵	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於落葵頭	
珠蔥	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於紅蔥 頭	
胡蘿蔔	蚜蟲類	0.04-0.5 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
甜菜	蚜蟲類	0.04-0.1	6,000	害蟲發生	7			6	適用於甜菜	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施藥。					根	
金針	蚜蟲類	0.1-0.3 公斤	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	適用於碧玉筍	
菱角	金花蟲類	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
蘆筍	金花蟲類	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
蘆筍	薊馬類	0.3 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄科果菜類	粉蟲類	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	採收前 6 天停止施藥，設施栽培採收前 12 天停止施藥。	
茄科果菜類	蚜蟲類	0.1-0.3 公斤	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	設施栽培 12 天停止施藥。	
茄科果菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	採收前 6 天停止施藥，設施栽培採收前 12 天停止施藥。	
番茄	銀葉粉蟲	0.2-0.25 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	本藥試驗時加展著劑「組展」3,000 倍	
金針	蚜蟲類	0.1-0.3 公斤	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
洛神葵	蚜蟲類	0.1-0.2 公斤	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	設施栽培 12 天停止施藥。	
秋葵	粉蟲類	0.1-0.5 公	4,000	害蟲發生	7			6	採收前 6 天	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		斤		時開始施藥。					停止施藥，設施栽培採收前 12 天停止施藥。	
秋葵	蚜蟲類	0.1-0.3 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	設施栽培 12 天停止施藥。	
秋葵	葉部 薊 馬類	0.1-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	採收前 6 天 停止施藥，設 施栽培採收 前 12 天停止 施藥。	
瓜菜類	葉部 薊 馬類	0.2-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免苗期使 用。	
豆菜類	薊馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	葉部 薊 馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆科豆 菜類	葉部 薊 馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		重複範圍，本 項刪除。
瓜果類	葉部 薊 馬類	0.2-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免苗期使 用。	
瓜果類	南黃 薊 馬	0.2-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	本藥劑試驗 時加組展(展 著劑)3,000 倍。	
黃金果	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
香蕉	粉介殼 蟲類	0.1-0.4 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施	7			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
木瓜	粉介殼 蟲類	0.2-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
木瓜	薊馬類	0.1-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
鳳梨	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
番荔枝	粉介殼 蟲類	0.4-0.5 公 斤	2,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				7		
番荔枝	薊馬類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
酪梨	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
酪梨	薊馬類	0.3-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
紅龍果	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
紅龍果	薊馬類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
百香果	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
百香果	薊馬類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
紅毛丹	軟介殼 蟲類	0.2-0.6 公 斤	2,500	害蟲發生 時施藥 1 次。	-			7		本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	0.4-0.8 公 斤	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
草莓	葉部薊 馬類	0.25-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	採果期避免 施藥。	
葡萄	薊馬類	0.3-0.4	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
楊桃	薊馬類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
蓮霧	葉蟬類	0.3-0.8 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			12		
蓮霧	腹鉤薊 馬	0.3-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。				9		
番石榴	葉蟬類	0.3-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			12		
番石榴	薊馬類	0.3-0.5 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
無患子 科核果 類	軟介殼 蟲類	0.2-0.6 公 斤	2,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				7		
龍眼	椿象類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 期使用。	
荔枝	椿象類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	避免於開花 期使用。	
檬果	葉蟬類	0.3-0.5 公 斤	4,000	抽穗及開 花期害蟲 發生時開 始施藥。	10			6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
椪果	葉蟬類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
椪果	粉介殼蟲類	0.4-0.8 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
椪果	薊馬類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
梨果類	薊馬類	0.2-0.6 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
薔薇科 梨果類	薊馬類	0.15-0.63 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
梨	柑桔捲葉蚜	0.3-0.4 公斤	4,000	蚜蟲發生時施藥 1 次。				6		
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.15-0.63 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.15-0.63 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		重複範圍，本項刪除。
柿	薊馬類	0.15-0.63 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
柑桔類	蚜蟲類	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
柑桔類	薊馬類	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
花木	夜蛾類	0.2-0.8 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									面積藥害測試。	
花木	粉蝨類	0.2-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
花木	銀葉粉 蝨	0.2-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。本藥劑試 驗時加組展 (展著 劑)3,000 倍。	
花木	蚜蟲類	0.1-0.4 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
花木	薊馬類	0.2-0.8 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
菊	粉蝨類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	蚜蟲類	0.1-0.2 公 斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.1-0.4 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		重複範圍，本 項刪除。
菊	薊馬類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
野薑	夜蛾類	0.3-0.8 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
蓮	夜蛾類	0.4-0.6 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7		應 噴 及 葉 背。	6		
蓮	葉 部 薊 馬類	0.2-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	禁 止 使 用 於 蓮 子。	
蓮	小 黃 薊 馬	0.4-0.6 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7		應 噴 及 葉 背。	6		
玫瑰	粉蟲類	0.3-0.6 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
玫瑰	薊馬類	0.3-0.8 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
臺灣樂 樹	椿象類	0.2-0.4 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	薊馬類	0.3-0.8 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
睡蓮	薊馬類	0.4-0.6 公 斤	3,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				12		
山 茶 科 茶類	葉蟬類	0.3-0.8 公 斤	4,000	萌芽初期 葉蟬發生 時施藥 1 次。				12	茶 葉 採 收 前 12 天、採籽前 21 停止施藥。	
茶	小 綠 葉 蟬	0.25 公斤	4,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				12		
茶	薊馬類	0.3-0.8 公	4,000	害蟲發生	7			12	適用於茶葉	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		斤		時開始施藥。						
黃耆	薊馬類	0.1-0.2 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
風茹	蚜蟲類	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	薊馬類	0.1-0.3 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
當歸	蚜蟲類	0.04-0.5 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
丹參	蚜蟲類	0.04-0.1 公斤	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
荔枝	荔枝細 蛾	0.2-0.4 公 斤	4,000	花落後 7- 10 天開 始施藥。	7	連續 2-3 次		7	避免於開花 期使用。與荔 枝椿象聯合 防治時，一個 生長季不超 過 4 次。	本項新 增。
龍眼	荔枝細 蛾	0.2-0.4 公 斤	4,000	花落後 7- 10 天開 始施藥。	7	連續 2-3 次		7	避免於開花 期使用。與荔 枝椿象聯合 防治時，一個 生長季不超 過 4 次。	本項新 增。