

「賽派芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 20 日農授防字第 1111488895A 號公告修正

30 (%) (w/w) 賽派芬 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
香蕉	葉蟬類	0.11- 0.36 公 升	2,500	害蟬發生初 期開始施藥 1 次。				7		
木瓜	葉蟬類	0.8 公升	2,500	於葉蟬發生 達每葉 10 隻時施藥 1 次。				3		
番荔枝	葉蟬類	0.25- 0.6 公升	2,500	害蟬發生初 期開始施藥 1 次。				7		
百香果	葉蟬類	0.32- 0.64 公 升	2,500	害蟬發生初 期開始施藥 1 次。				7		
檬果	葉蟬類	0.36- 0.8 公升	2,500	害蟬發生初 期開始施藥 1 次。				7		
茶	葉蟬類	0.4 公升	5,000	葉蟬每葉發 生達 3-5 隻 時開始施 藥。	7	最多 2 次		14	適用於茶葉。	
柑桔類	葉蟬類	0.8 公升	2,500	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		本項 新增