

番茄番茄潛旋蛾緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項	說明
2.4%第滅寧 SC (deltamethrin)	1.0-1.5公升	1,000	害蟲發生時施藥 1 次。	採收前 12 天停止施藥。	
2.8%第滅寧 EC (deltamethrin)	1.0-1.5公升	1,000	害蟲發生時施藥 1 次。	採收前 12 天停止施藥。	
2.8%第滅寧 EW (deltamethrin)	1.0-1.5公升	1,000	害蟲發生時施藥 1 次。	採收前 12 天停止施藥。	
2.5%畢芬寧 SC (bifenthrin)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
2.8%畢芬寧 EC (bifenthrin)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
20%亞滅培 SP (acetamiprid)	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
2.50%賜諾殺 SC (spinosad)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，	採收前 3 天停止施藥。	

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項	說明
			共 2 次。		
11.60%賜諾殺 SC (spinosad)	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停止施藥。	
80.0%賜諾殺 WP (spinosad)	0.01-0.05 公升	32,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停止施藥。	
2.0%阿巴汀 EC (abamectin)	0.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 12 天停止施藥。	
2.0%阿巴汀 EW (abamectin)	0.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 12 天停止施藥。	
2.150%因滅汀 EC (emamectin benzoate)	0.3-1.0 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
2.150%因滅汀 EW (emamectin benzoate)	0.3-1.0 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
2.150%因滅汀 SC (emamectin benzoate)	0.3-1.0 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，	採收前 6 天停止施	

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項	說明
			間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	藥。	
5.0%因滅汀 SG (emamectin benzoate)	0.1-4.0 公 斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
19.2 G/L (1.92% W/V)因滅汀 EC (emamectin benzoate)	0.3-1.0 公 升	1,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
10% 克凡派 SC (chlorfenapyr)	0.5-1.5 公 升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 9 天停止施藥。	
14.5%因得克 SC (indoxacarb)	0.5-0.8 公 升	2,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
15.8%因得克 EC (indoxacarb)	0.5-0.8 公 升	2,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。	
<u>54% (32,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 WG (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-</u>	<u>0.3-1.0 公 斤</u>	<u>1,500</u>	<u>害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。</u>		本項新增。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項	說明
<u>351)</u>					
<u>48.1% (35,000 DBMU/MG) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 WG (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857)</u>	<u>0.5-1.5 公 斤</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。</u>		本項新增。
<u>54% (15,000 IU/MG) 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200)</u>	<u>0.5-1.5 公 斤</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。</u>		本項新增。