

「達滅克敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 B 號公告修正

18.7% 達滅克敏 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	露菌病	0.66-0.8 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科包 葉菜類	露菌病	0.2-0.7 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科包 葉菜類	疫病	0.3-1 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
豌豆	露菌病	0.3-0.5 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	露菌病	0.66-0.8 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科小 葉菜類	露菌病	0.2-0.7 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科小 葉菜類	疫病	0.3-1 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9	採收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
菠菜	露菌病	0.2-0.7 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
十字花 科根菜 類	露菌病	0.66-0.8 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科根 菜類	露菌病	0.2-0.7 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
馬鈴薯	晚疫病	0.5-2 公	1,000	病害發生	7	4		7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		斤		初期開始 施藥。						
薑	疫病	0.9-1.2 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
芋	疫病	0.8-1.2 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
番茄	晚疫病	1 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		6	採收前 6 天 (設施栽培 12 天) 停止 施藥。	本項修 正。
瓜菜類	露菌病	1 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		12	本藥劑使用 範圍：瓜菜 類露菌病 (胡瓜除 外)。	
瓜果類	露菌病	1 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		12		
百香果	疫病	0.8-1.6 公斤	1,000	雨季來臨 前開始施 藥。	7	共 4 次		12		
草莓	果腐病	0.6-0.8 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	2		5	禁止使用於 設施栽培。	
葡萄	露菌病	1-1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		15		
蓮霧	疫病	1.2-1.5 公斤	1,000	開花盛期 開始施 藥， <u>施藥</u> 至 <u>套袋前</u> 為止。	7			15		本項修 正。
番石榴	疫病	1.2-2.0 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥，施	7			15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥至套袋 前為止。						
無花果	白腐病	0.8-1.6 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
花木	疫病	0.4-1.7 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	露菌病	0.2-0.8 公斤	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			28	限花苞形成 前使用。	
菊	疫病	0.3-1.2 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			28	限花苞形成 前使用。	
洛神葵	疫病	0.4-2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		本 項 新 增。
秋葵	疫病	0.4-2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		本 項 新 增。