

「百克敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 5 月 11 日農授防字第 1091488644A 號公告修正
中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 H 號公告修正

23.6% 百克敏 乳劑 (EC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
向日葵	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21	葵瓜子採收 前 21 天停 止用藥。	
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科包 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
旋花科 小葉菜 類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
豆科小 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
十字花 科小葉 菜類	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科小 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
艾草	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
蔥科小 葉菜類	銹病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10	3		9		
蔥科小	炭疽病	0.3-0.7	3,000	病害發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		初期開始 施藥。						
韭	銹病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10	3		9	限使用於韭 菜，不得使 用於韭黃及 韭菜花。	
葫蘆科 小葉菜 類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
芹菜	炭疽病	0.08-1 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
莧菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
山蘇	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
旋花科 根菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
豆科根 菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
蘿蔔	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
牛蒡	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
蔥科根	銹病	0.4-0.5	2,500	病害發生	10			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菜類		公升		初期開始 施藥。						
蔥科根 菜類	炭疽病	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
胡蘿蔔	炭疽病	0.08-1 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
茄科果 菜類	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	生育初 期、開花 初期或中 果期施 藥。	7			6		
甜椒	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	中果期施 藥。	7	3		6		
金針	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			7	適用於金 針。	
金針	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			21	適用於碧玉 筍。	
瓜菜類	露菌病	0.35-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
瓜菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
豆菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
瓜果類	露菌病	0.35-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
瓜果類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
香蕉	炭疽病	0.1-0.3	3,000	開花初期	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		施藥。						
香蕉	黑星病	0.3 公升			14	3	加水至 30 公升/ 公頃，以 動力微 粒噴霧 器將藥 劑噴射 於香蕉 心葉及 其他葉 片。	3		
木瓜	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病	0.3-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
百香果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
草莓	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9	育苗期需加 強防治本 病。	
葡萄	晚腐病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
楊桃	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
蓮霧	炭疽病		2,400	開花初期 施藥，施	7			15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥至套袋 前為止。						
番石榴	炭疽病	0.4-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
無花果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
檬果	炭疽病		3,000	開花初期 施藥，謝 花結果後 每隔 14 天施藥一 次，至套 袋前為 止。	7			12		
薔薇科 梨果類	炭疽病	0.1-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
鼠李科 梨果類	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
柿	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
柿	角斑病		3,000	六月上旬 或病害發 生初期開 始施藥。	10-14	4		15		
柑桔類	炭疽病	0.3-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
椰子	炭疽病	0.2-0.7	3,000	病害發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		初期開始 施藥。						
花木	炭疽病	0.2-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
洋甘菊	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
百合	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			7	百合花採收 前 7 天，百 合鱗莖採收 前 21 天停 止施藥。	
山茶科 茶類	赤葉枯 病	0.3-1 公 升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
茶	茶餅病	0.33 公 升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			21		
風茹	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
金線連	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
咖啡	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			45	避免與滲透 性強的展著 劑混合使 用，以免發 生藥害。	
可可	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始	7			45	避免與滲透 性強的展著	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。					劑混合使用，以免發生藥害。	
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。		1			施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。		1			施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
檳榔	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7	4		7		
臺灣藜	炭疽病	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			30		本項新增。
甜菜	炭疽病	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			9	適用於葉用甜菜。	本項新增。
甜菜	炭疽病	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於甜菜根。	本項新增。
洛神葵	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		本項新增。

23.6% 百克敏 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
向日葵	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始	7			21	葵瓜子採收前 21 天停	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					止用藥。	
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科包 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
旋花科 小葉菜 類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
豆科小 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
十字花 科小葉 菜類	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
菊科小 葉菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
艾草	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
蔥科小 葉菜類	銹病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10	3		9		
蔥科小 葉菜類	炭疽病	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
韭	銹病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10	3		9	限使用於韭 菜，不得使 用於韭黃及 韭菜花。	
葫蘆科 小葉菜 類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始	7	3		9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						
山蘇	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
旋花科 根菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
豆科根 菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
蘿蔔	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		9		
牛蒡	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
蔥科根 菜類	銹病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			9		
蔥科根 菜類	炭疽病	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9		
茄科果 菜類	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	生育初 期、開花 初期或中 果期施 藥。	7			6		
甜椒	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	中果期施 藥。	7	3		6		
金針	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			7	適用於金 針。	
金針	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始	10			21	適用於碧玉 筍。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						
瓜菜類	露菌病	0.35-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
瓜菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
豆菜類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
瓜果類	露菌病	0.35-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
瓜果類	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
香蕉	炭疽病	0.1-0.3 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
香蕉	黑星病	0.3 公升			14	3	加水至 30 公升/ 公頃，以 動力微 粒噴霧 器將藥 劑噴射 於香蕉 心葉及 其他葉 片。	3		
木瓜	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病	0.3-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
百香果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
草莓	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			9	育苗期需加 強防治本 病。	
葡萄	晚腐病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
楊桃	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
蓮霧	炭疽病		2,400	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			15		
番石榴	炭疽病	0.4-0.7 公升	3,000	開花初期 施藥，施 藥至套袋 前為止。	7			12		
無花果	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公升	3,000	開花初期 施藥。	7			12		
檬果	炭疽病		3,000	開花初期 施藥，謝 花結果後 每隔 14 天施藥一 次，至套 袋前為 止。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
薔薇科 梨果類	炭疽病	0.1-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
鼠李科 梨果類	炭疽病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
柿	炭疽病	0.3-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
柿	角斑病		3,000	六月上旬 或病害發 生初期開 始施藥。	10-14	4		15		
柑桔類	炭疽病	0.3-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
椰子	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
花木	炭疽病	0.2-0.8 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
洋甘菊	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
百合	銹病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	10			7	百合花採收 前 7 天，百 合鱗莖採收 前 21 天停 止施藥。	
山茶科 茶類	赤葉枯 病	0.3-1 公 升	3,000	病害發生 初期開始	7			21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
茶	茶餅病	0.33 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	10			21		
風茹	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
金線連	炭疽病	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
咖啡	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			45	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
可可	炭疽病	0.2-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			45	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。		1			施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。		1			施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

100G/L(10.0%W/V) 百克敏 膠囊懸著劑 (CS)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	穗稻熱病	0.875 公升	1,000	抽穗初期開始施藥。	10	連續 2 次		35		本項新增。原始登記廠商名

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
										稱：台灣 巴斯夫 股份有 限公司。