

「嘉賜克枯爛」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 F 號公告修正

14.0% 嘉賜克枯爛 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔(天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	葉稻熱 病	0.67 公斤	1,500	病害 發生 初期 開始 施藥。	10			14	1. <u>標示加註不可與強酸或強鹼性藥劑混合使用。</u> 2. <u>本藥劑混合 25% 賓克隆可濕性粉劑、75% 三賽唑可濕性粉劑等農藥可能發生藥害。</u>	原注意 事項 已禁 用或 限制 使用 方 法 及 其 範 圍 之 農 藥 ， 本 項 修 正。
水稻	白葉枯 病	0.8 公斤	1,500	病害 發生 初期 開始 施藥。	10	3		14	1. <u>標示加註不可與強酸或強鹼性藥劑混合使用。</u> 2. <u>本藥劑混合 25% 賓克隆可濕性粉劑、75% 三賽唑可濕性粉劑等農藥可能發生藥害。</u>	原注意 事項 已禁 用或 限制 使用 方 法 及 其 範 圍 之 農 藥 ， 本 項 修 正。
蔥	細菌性 軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發病 初期 於地 際部 施藥。	7	共 3 次		6		本項修 正。
蒜	細菌性 軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發病 初期 於地	7	共 3 次		6		本項新 增。原 始登 記廠

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔(天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				際 部 施藥。						商 名 稱：大勝 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司。
韭	細菌性 軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發 病 初 期 於 地 際 部 施藥。	7	共 3 次		6		本 項 新 增。原始 登 記 廠 商 名 稱：大勝 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司。
落 蓯	細菌性 軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發 病 初 期 於 地 際 部 施藥。	7	共 3 次		6		本 項 新 增。原始 登 記 廠 商 名 稱：大勝 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司。
珠 蔥	細菌性 軟腐病	0.8-2.0 公 斤	1,000	發 病 初 期 於 地 際 部 施藥。	7	共 3 次		6		本 項 新 增。原始 登 記 廠 商 名 稱：大勝 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司。