

「曼普胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 K 號公告修正

250 G/L (25% W/V) 曼普胺 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
馬鈴薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
馬鈴薯	晚疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		15		本 項 修 正。
番茄、 甜椒、 辣椒、 茄子、 枸杞	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	查 茄 科 果 菜 類 範 圍 僅 「 番 茄 、 甜 椒 、 辣 椒 、 茄 子 、 枸 杞 」 完 整 訂 有 農 藥 殘 留 容 許 量 ， 修 正 作 物 品 項。
番茄	晚疫病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天 (設施栽 培 21 天) 停 止施藥。	
洛神葵	疫病	0.2-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
秋葵	疫病	0.2-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		
胡瓜	露菌病	0.5 公升	2,500	病害發生	7			6	採收前 6 天	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				初期開始 施藥。					(設施栽培 12 天) 停止 施藥	
西瓜	露菌病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		6		
草莓	疫病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
花木	疫病	0.2-1 公 升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
牛蒡	疫病	0.4-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		本項新 增。
洋蔥	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		本項新 增。
落葵	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		本項新 增。
珠蔥	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		本項新 增。
蒜	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		本項新 增。
豆薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		本項新 增。
狗尾草	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		本項新 增。
闊葉大 豆	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始	7	連續 3 次		15		本項新 增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				<u>施藥。</u>						
<u>芋</u>	<u>疫病</u>	<u>0.3-0.5</u> <u>公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生</u> <u>初期開始</u> <u>施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>15</u>		本 項 新 增。
<u>薑</u>	<u>疫病</u>	<u>0.4-0.5</u> <u>公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生</u> <u>初期開始</u> <u>施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>15</u>		本 項 新 增。
<u>甘藷</u>	<u>疫病</u>	<u>0.1-0.4</u> <u>公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生</u> <u>初期開始</u> <u>施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>15</u>	<u>適用於甘藷</u> <u>塊根。</u>	本 項 新 增。