

「賜滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 E 號公告修正

240 G/L (24% W/V) 賜滅芬 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
仙草	葉蟬類	0.35-0.75 公升	2,000	葉蟬發生時 施藥 1 次。				21		
馬鈴薯	葉蟬類	0.14-0.45 公升	2,000	葉蟬發生時 施藥 1 次。				21		查 未 訂 有 容 許 量，本項 刪除。
茄 科 果 菜類	葉蟬類	0.3-0.4 公 升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。				4		
香蕉	葉蟬類	0.14-0.45 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
木瓜	葉蟬類	0.25- 1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7	施用時須注 意避免幼嫩 葉片接觸過 量藥劑。	
番荔枝	葉蟬類	0.35- 0.75 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
酪梨	葉蟬類	0.5-1.0 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
百香果	葉蟬類	0.4-0.8 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
草莓	葉蟬類	0.6-1.0 公 升	2,000	葉蟬發生時 施藥 1 次。				7		
葡萄	葉蟬類	0.4-0.8 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
楊桃	葉蟬類	0.4-0.8 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
番石榴	葉蟬類	0.6-1 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		
龍眼	葉蟬類	0.38- 0.75 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
荔枝	葉蟬類	0.3- 0.6 公 升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
檬果	葉蟬類	0.45- 1.0 公升	2,000	害蟬發生時 施藥 1 次。				7		
薔薇科 梨果類	葉蟬類	0.5 公升	2,000	害蟬發生初 期施藥 1 次。	14			7		
鼠李科 梨果類	葉蟬類	0.4-0.6 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			7		查鼠李 科梨果 類範圍 僅「印 度棗」 完整 訂有農 藥殘留 容許量 ，且印 度棗葉 蟬類重 複範圍 ，本項 刪除。
印度棗	葉蟬類	0.4-0.6 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			7		
菊	葉蟬類	0.45-0.6 公升	2,000	葉蟬發生時 施藥 1 次。				21		
茶	葉蟬類	0.5-1.5 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			21	適用於茶 葉。	
風茹	葉蟬類	0.45-0.6 公升	2,000	葉蟬發生時 施藥 1 次。				21		
柑桔類	葉蟬類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥 1 次。				14		本項新 增。