

「賽普護汰寧」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 1 月 13 日農授防字第 1101488045A 號公告修正

62.5% 賽普護汰寧 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥方法	安 全 採 收 期(天)	注意事項	說明
枸杞	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	適用於枸杞 葉。	查茄科 小葉菜 類範圍 僅「枸杞 葉」完整 訂有農 藥殘留 容許量， 修正作 物品項。
馬鈴薯	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		查茄科 根菜類 範圍僅 「馬鈴 薯」完整 訂有農 藥殘留 容許量， 修正作 物品項。
洋蔥	黃萎病	0.6-0.8 公斤	1,500	洋蔥定植 10 天後 施藥。	7	3		21		
茄子、 香瓜 茄、野 茄、番 茄、樹 番茄、 甜椒、	灰黴病	0.3-0.8 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		查茄科 果菜類 範圍僅 「茄 子、香瓜 茄、野 茄、番

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
辣椒、枸杞										茄、樹番茄、甜椒、辣椒、枸杞」完整訂有農藥殘留容量，修正作物品項
豆菜類	灰黴病	0.3-0.4公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			14	豆菜類(毛豆除外)採收前 14 天停止施藥。	
香蕉	炭疽病	0.1-0.5公斤	2,000	開花初期施藥。	7			12		
木瓜	炭疽病		1,500	發病季節著果後施藥。	7	5		9		
番荔枝	炭疽病	0.4-0.8公斤	2,000	開花初期施藥。	7			12		
番荔枝	果腐病		1,500	結果初期施藥。	7	3		12		
酪梨	炭疽病	-	2,000	開花結果期及套袋前施藥。	10-14	各 2 次	於開花結果期及套袋前施藥，10-14 天後再施藥一次。	6		
紅龍果	炭疽病	0.4-0.8公斤	2,000	開花初期施藥。	7			12	-	
百香果	炭疽病	0.4-0.8公斤	2,000	開花初期施藥。	7			12	-	
紅毛丹	炭疽病	0.3-0.6公斤	2,000	開花初期施藥。	7			12	-	
草莓	灰黴病	0.5 公斤	2,000	病害發生	7	2		5		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥方法	安 全 採 收 期(天)	注意事項	說明
				初期開始 施藥。						
葡萄	晚腐病		1,500	謝花後施 藥。	7-10	4		12		
楊桃	炭疽病	0.4-0.8 公斤	2,000	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止	
蓮霧	炭疽病	0.5-1.5 公斤	2,000	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止	
蓮霧	果腐病	-	1,500	開花初期 施藥。	7			12		
番石榴	炭疽病	0.6-1 公 斤	2,000	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止	
番石榴	黑星病	-	1,500	著果後施 藥。	10		均勻噴佈 全株， 施。至套 袋止，最 多五次	12		
無花果	炭疽病	0.4-0.8 公斤	2,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.3-0.6 公斤	2,000	開花初期 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病	0.3-0.6 公斤	2,000	開花初期 施藥。	7			12		
檬果	炭疽病		2,000	開花初期 及結果後 施藥。				9		
薔薇科 梨果類	炭疽病	0.2-1.3 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			18		本項修 正。
鼠李科 梨果類	炭疽病	0.4-0.6 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			18		本項修 正。
柿	炭疽病	-	1,500	開花結果 期及套袋 前施藥。	7	各 2 次	-	18		
柿	灰黴病	-	1,500	於開花結 果期及幼	7	各 2 次	-	18		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				果期施藥。						
柑桔類	炭疽病	0.5-1.2公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		本項修正。
花木	灰黴病	0.65 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7	3			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	灰黴病	0.2-0.8公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7			35	限花苞形成前使用。	
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
蔬菜	種子檢疫處理	-	-	檢疫處理時施藥 1 次					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
檳榔	炭疽病	0.3 - 1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 4 次		21		本項新增。