

「撲克拉錳」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713J 號公告修正

50% 撲克拉錳 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|------------|-------|-------------|---------|------|--------------|----------|---|----|
| 菱角 | 炭疽病 | 0.3 公斤 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 3 | | 6 | | |
| 洋菇 | 褐斑病 | 0.5-1 公克/坪 | 3,000 | 播種覆土後施藥。 | | | | 2 | 覆土後 7 天施藥一次，如有發病時，再施用一次。 | |
| 瓜果類 | 蔓枯病 | 0.25 公斤 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 應注意將藥劑噴射莖基部。 | 9 | | |
| 番荔枝 | 炭疽病 | 0.1-0.3 公斤 | 6,000 | 開花初期施藥。 | 7 | | | 9 | | |
| 葡萄 | 晚腐病 | | 6,000 | 開花初期施藥。 | 10 | 7 | | 9 | 本劑試驗時加展著劑「TRITON CS-7」每 1,000 公升藥液加二公升。 | |
| 蓮霧 | 炭疽病 | | 4,000 | 開花盛期施藥。 | 7 | 4-5 | | 6 | 本劑試驗時加展著劑「日展寶」3,000 倍。 | |
| 檬果 | 炭疽病 | | 6,000 | 滿花後期施藥。 | 7 | 5-7 | | 6 | 本劑試驗時加展著劑「來著通 CS-7」每 1,000 公升藥液加二公升。 | |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|---------|------|---------|------|--------------|---------|------|------|----------|--------------------------|-------|
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | | | 檢疫處理時施藥 1 次。 | | | | | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 | |
| 輸入植物檢疫物 | 檢疫處理 | | | | | | | | 依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。 | 本項新增。 |