

「得克利」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713L 號公告修正

25.9% 得克利 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	消毒		2,000				稻種直接消毒24小時後，再浸水催芽。			
落花生	銹病	0.5 公升	2,000	播種後病害發生初期開始施藥。	10	4	施藥時應噴及葉片上下兩面。	7		
胡瓜、 夏南瓜	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	胡瓜限開花前使用。	本項修正。
瓜果類	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
洋香瓜	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		本項恢復為原登記作物品項。
香蕉	炭疽病	0.2-0.6 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
木瓜	炭疽病	0.3-1.3 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
番荔枝	炭疽病	0.5-1 公 升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
酪梨	炭疽病	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
紅龍果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
百香果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
紅毛丹	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
葡萄	晚腐病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			12	1. 施藥至 套袋前 為止。 2. 採收前 12 天 (設 施 栽 培 18 天) 停止施 藥。	
楊桃	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6	施藥至套袋 前為止。	
蓮霧	炭疽病		2,000	開花初期 施藥。	7			6	開花初期開 始施藥，每 隔 7 天施藥 一次，至套 袋前為止。	
番石榴	炭疽病	0.8-1.3 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6	施藥至套袋 前為止。	
無花果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	小果期施 藥。	7			6		
龍眼	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6		
荔枝	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6		
檬果	炭疽病		1,500	病害發生 初期開始 施藥開始 使用。	7-10	5-6		6	若採套袋 者，可於套 袋前施藥並 立即套袋， 套袋後停止 施藥	本項修 正。
梨	炭疽病	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			18		
梨	赤星病		2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7-10	4		18		
蘋果	炭疽病	0.6-0.8	1,500	開花初期	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		施藥。						
桃	炭疽病	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
梅	炭疽病	0.8-1.2 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
枇杷	炭疽病	1-1.3 公 升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
鼠李科 梨果類	炭疽病	0.5-0.8 公升	1,500	幼果期開 始施藥。	7-10	最多 4 次		21		
柿	炭疽病		2,000	幼果期施 藥。	7	2		21		
茶	赤葉枯 病	0.4 公升	2,500	採茶後 7 天施藥。	7	2	應將藥 劑施到 葉背及 葉叢內。	15	發病嚴重 時，應先剪 除枝葉叢， 燒毀後施 藥。	
咖啡	炭疽病	0.5-1 公 升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			30		
可可	炭疽病	0.6-1.3 公升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			30		
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植 物檢疫物檢 疫處理消毒 方法」之規 定處理。	本項新 增。

250 G/L (25% W/V) 得克利 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	消毒		2,000				稻種直接消毒24小時後，再浸水催芽。			
落花生	銹病	0.5 公升	2,000	播種後病害發生初期開始施藥。	10	4	施藥時應噴及葉片上下兩面。	7		
胡瓜、 夏南瓜	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	胡瓜限開花前使用。	本項修正。
瓜果類	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
洋香瓜	白粉病	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		本項恢復為原登記作物品項。
香蕉	炭疽病	0.2-0.6 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
木瓜	炭疽病	0.3-1.3 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
番荔枝	炭疽病	0.5-1 公 升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
酪梨	炭疽病	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
紅龍果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
百香果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
紅毛丹	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期施藥。	7			6		
葡萄	晚腐病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期施藥。	7			12	1. 施藥至套袋前	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									為止。 2. 採收前 12 天 (設 施 栽 培 18 天) 停止施 藥。	
楊桃	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6	施藥至套袋 前為止。	
蓮霧	炭疽病		2,000	開花初期 施藥。	7			6	開花初期開 始施藥，每 隔 7 天施藥 一次，至套 袋前為止。	
番石榴	炭疽病	0.8-1.3 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6	施藥至套袋 前為止	
無花果	炭疽病	0.5-1.1 公升	1,500	小果期施 藥。	7			6		
龍眼	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6		
荔枝	炭疽病	0.4-0.8 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			6		
檬果	炭疽病		1,500	病害發生 初期開始 施藥開始 使用。	7-10	5-6		6	若採套袋 者，可於套 袋前施藥並 立即套袋， 套袋後停止 施藥。	本項修 正。
梨	炭疽病	0.7-1.3 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			18		
梨	赤星病		2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7-10	4		18		
蘋果	炭疽病	0.6-0.8 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
桃	炭疽病	0.7-1.3	1,500	開花初期	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		施藥。						
梅	炭疽病	0.8-1.2 公升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
枇杷	炭疽病	1-1.3 公 升	1,500	開花初期 施藥。	7			21		
鼠李科 梨果類	炭疽病	0.5-0.8 公升	1,500	幼果期開 始施藥。	7-10	最多 4 次		21		
柿	炭疽病		2,000	幼果期施 藥。	7	2		21		
茶	赤葉枯 病	0.4 公升	2,500	採茶後 7 天施藥。	7	2	應將藥 劑施到 葉背及 葉叢內。	15	發病嚴重 時，應先剪 除枝葉叢， 燒毀後施 藥。	
咖啡	炭疽病	0.5-1 公 升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			30		
可可	炭疽病	0.6-1.3 公升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			30		