

「芬滅松」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713N 號公告修正

40% 芬滅松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	線蟲白尖病		1,000	預浸 24 小時,再浸藥 2 小時。						本項修正。
草莓	葉芽線蟲	0.16 公升	3,000	浸苗時施藥。						
柑桔類	寄生性線蟲類	3 公升	2,000	新芽萌發時施藥。					在樹冠下方均勻噴灑稀釋液每棵約 15 公升,施藥前土讓宜保持適當濕潤。	本項修正。
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。	本項新增。

10% 芬滅松 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	線蟲白尖病	每育苗箱 60g		秧苗綠化期均勻撒佈施藥 1 次。			均勻撒佈。	-	不可施用於本田。	
落花生	根瘤線蟲	15 公斤		種植前施藥 1 次。			<ol style="list-style-type: none"> 1. 種植當日將藥劑條施於 15 公分深植溝內，覆土後播種。 2. 土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時必須戴手套。 	
胡蘿蔔	根瘤線蟲	20-40 公斤		播種前施藥 1 次。			<ol style="list-style-type: none"> 1. 施於植溝約 10 公分深處，覆土後種植。 2. 土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時必須戴手套。 	
薑	根瘤線蟲	100 公斤		開溝條施後施藥 1 次。			<ol style="list-style-type: none"> 1. 將藥劑條施於植溝內土覆後，經 10~14 天種 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							2. 植。土壤須保持濕潤才能發揮藥效。		必須戴手套。	
番茄	根瘤線蟲	30 公斤		移植時施藥 1 次。			1. 移植當日將藥劑條施於 15 公分深之溝內，覆土後定植。 2. 土壤須保持濕潤才能發揮藥效。		1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時必須戴手套。	
瓜果類	根瘤線蟲	15 公斤		種植時施藥 1 次。			1. 種植當日將藥劑施於溝內，覆土後定植。 2. 土壤須保持濕潤才能發揮藥效。		1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時必須戴手套。	
柑桔類	寄生性線蟲類	30 公斤		萌芽時施藥 1 次。			春芽萌發時，於樹冠外圍下開 15 公分深環溝，將藥劑均勻撒		1. 限種植前使用，生長期不可施	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							佈於溝底，覆土後灌水，保持適當濕度。		用； 2. 施藥時必須戴手套。	

5% 芬滅松 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	根瘤線蟲	30 公斤		種植時施藥 1 次			1. 種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。 2. 土壤須保持濕潤才能發揮藥效。		1. 限種植前使用，生長期不可施用； 2. 施藥時必須戴手套。	