

「阿巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713A 號公告修正

2% 阿巴汀 乳劑 (EC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔬菜	番茄斑 潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	14			6	小葉菜類採 收前 6 天停 止施藥；包 葉菜類採收 前 6 天停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
豌豆	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科小葉 菜類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
芥藍	銀葉粉 蝨	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		10		
茄科小 葉菜類	斑潛蠅 類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科小 葉菜類	蚜蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施	7			3		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
豆薯	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
樹薯	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3		
十字花 科根菜 類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科根菜 類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
牛蒡	斑潛蠅 類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
茄科根 菜類	斑潛蠅 類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科根 菜類	蟬蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
芋	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			15		
茄科果 菜類	斑潛蠅 類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科果 菜類	蟬蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
番茄	番茄斑 潛蠅	0.5-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
茄子	二點小 綠葉蟬	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
茄子	二點葉 蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
枸杞	銹蟬類	0.25-0.7 5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		12		
大豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於毛 豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-0.8	2,000	害蟲發生	7			7	適用於鮮	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。					豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮 豆。	
瓜果類	銀葉粉 蝨	1-1.7 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
瓜果類	番茄斑 潛蠅	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	14			6		
草莓	二點葉 蟎	0.5-1 公 升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
葡萄	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
桑樹	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
柑桔類	銹蟬類	1 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。		1-2		6		
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	斑潛蠅 類	0.25-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				適用於觀賞 花卉。	本項修 正。
菊	斑潛蠅 類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
茉莉	葉蟬類	0.67-1.6 7 公升	1,500	害蟬發生 時開始施 藥。	7			7		
茶	銹蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
破布子	銹蟬類	0.45-1.0 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3		
蘭科作物	檢 疫 處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
果苗	檢 疫 處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	本 項 新 增

2%阿巴汀 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔬菜	番 茄 斑 潛 蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	14			6	小葉菜類採 收前 6 天停 止施藥；包 葉菜類採收 前 6 天停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
豌豆	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	適用於葉用 豌豆	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科小葉 菜類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
芥藍	銀葉粉 蝨	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		10		
茄科小 葉菜類	斑潛蠅 類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科小 葉菜類	蚜蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
甘藷	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
豆薯	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
樹薯	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉蟬類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
十字花 科根菜 類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
十字花 科根菜 類	黃條葉 蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
牛蒡	斑潛蠅 類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
茄科根	斑潛蠅	0.5-2 公	1,000	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菜類	類	升		時開始施藥。						
茄科根 菜類	蚜蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
芋	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			15		
茄科果 菜類	斑潛蠅 類	0.5-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄科果 菜類	蚜蟬類	0.25- 0.75 公 升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
番茄	番茄斑 潛蠅	0.5-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
茄子	二點小 綠葉蟬	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
茄子	二點葉 蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3		
枸杞	銹蟬類	0.25-0.7 5 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			12		
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		12		
大豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於毛豆	
花豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
樹豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施	7			7	適用於鮮豆	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
豌豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
蠶豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
扁豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
翼豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
刀豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
豇豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7	適用於鮮豆	
瓜果類	銀葉粉 蝨	1-1.7 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
瓜果類	番茄斑 潛蠅	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	14			6		
草莓	二點葉 蟎	0.5-1 公 升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
葡萄	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開花 期使用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
桑樹	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
柑桔類	銹蟬類	1 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。		1-2		6		
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	斑潛蠅 類	0.25-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				<u>適用於觀賞 花卉。</u>	本 項 修 正。
菊	斑潛蠅 類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
茉莉	葉蟎類	0.67-1.6 7 公升	1,500	害蟎發生 時開始施 藥。	7			7		
茶	銹蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			14	避免於開花 期使用。	
破布子	銹蟬類	0.45-1.0 公升	2,000	害蟎發生 時開始施 藥。	7			3		
蘭科作 物	檢 疫 處 理			檢疫處理 時施藥。1 次					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理	
果苗	<u>檢 疫 處 理</u>			<u>檢疫處理 時施藥 1 次。</u>					<u>施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。</u>	本 項 新 增

0.011%阿巴汀 餌劑 (RB)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
作物園	紅火蟻	2-4 公 斤					1.大面積處理時，於火蟻覓食區，利用撒佈器均勻撒佈。2.獨立蟻丘處理沿蟻丘周圍1公尺內撒佈。		1.餌劑應儘早使用。2.春秋季之早晨或傍晚（冬季上午 10 時至下午 3 時）地表溫度 21℃ 至 38℃時，施用在入侵火蟻活動覓食區。3.施用餌劑時地表須乾燥，若施用後 12 小時內下雨應重新施藥，且餌劑施放後 24 小時內勿灌溉。4.禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。	