

「毆殺滅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713C 號公告修正

5% 毆殺滅 粒劑 (GR)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	線蟲白 尖病	每育苗 箱 120 g		秧苗綠化 期。			均 勻 灑 佈。		1. 不可施 用於本 田。 2. 施藥時 必須戴 手套。	
蔥科小 葉菜類	葉芽線 蟲	0.6 公斤 /每平方 公尺					苗期均 勻撒佈 後，立即 灑水至 飽和狀。		限苗期使用	
山蘇	葉芽線 蟲	0.6 公斤 /每平方 公尺					苗期均 勻撒佈 後，立即 灑水至 飽和狀。		限苗期使用	
過溝菜 蕨	葉芽線 蟲	0.6 公斤 /每平方 公尺					苗期均 勻撒佈 後，立即 灑水至 飽和狀。		限苗期使用	
蔥科根 菜類	葉芽線 蟲	0.6 公斤 /每平方 公尺					苗期均 勻撒佈 後，立即 灑水至 飽和狀。		限苗期使用	
金針	葉芽線 蟲	0.6 公斤 /每平方 公尺					苗期均 勻撒佈 後，立即 灑水至 飽和狀。		適用於碧玉 筍	
茄科果	地下部	40-80		種植前施					1. 移植當	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菜類	線蟲類	公斤		藥。					日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。 2. 限種植前使用，生長期不可施用。 3. 施藥時必須戴手套。	
番茄	根瘤線蟲	40-80 公斤							1. 移植當日應開溝15公分條施之，並即行覆土，施藥完後可立即栽植。 2. 施藥時必須戴手套。	
金針	葉芽線蟲	0.6公斤 /每平方公尺					苗期均勻撒佈後，立即灑水至飽和狀。		適用於金針花	
瓜菜類	地下部	40-80					移植當		1. 限種植	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	線蟲類	公斤					日 將 藥 劑 條 施 於 15 公 分 深 之 植 溝 內，覆土 後定植。		前 使 用，生 長期不 可 施 用。 2. 施藥時 必須戴 手套。	
瓜果類	地下部 線蟲類	40-80 公斤							1. 移植當 日將藥 劑條施 於 15 公分深 之植溝 內，覆 土後定 植。 2. 施藥時 必須戴 手套。	
晚香玉	根瘤線 蟲	80 公斤					種 植 當 日 施 於 植 溝 內，覆土 後 再 種 植。		施藥時必須 戴手套。	
甘蔗	寄生性 線蟲類	80-120 公斤					將 藥 劑 均 勻 施 於 植 溝 內，覆土 後植蔗。		1. 適用於 春植砂 質地灌 溉方便 之蔗園 區。 2. 施藥時 必須戴 手套。	
荖藤	根瘤線 蟲	40 公斤							1. 種植當 日將藥	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									劑條施於植溝內再種植；於「落藤」時條施於根莖旁並加以覆土。 2. 施藥時必須戴手套。	

10% 毆殺滅 溶液 (SL)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	線蟲白尖病		450						稻種預浸24小時後,再浸藥處理2小時	
落花生	根瘤線蟲	2.88-3.6公升	350	生長初期施藥。					1. 種植同時植溝處理; 2. 種植當日應開溝15公分條施之,即可播種; 3. 種植後20天、40天葉面	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									噴藥各 一次;4. 限生育 早期 (40 天) 施用	
十字花 科包葉 菜類	黃條葉 蚤	2.4-4.8 公升	200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	黃條葉 蚤	2.4-4.8 公升	200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
芥菜	番茄斑 潛蠅	2.4-4.8 公升	200	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			6		
蒜	根蟎類	24 公 升	450	害蟎發生 時開始施 藥。	7	3		26	限種植後 45 天內使 用	
十字花 科根菜 類	黃條葉 蚤	2.4-4.8 公升	200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
番茄	根瘤線 蟲	30 公撮/ 每株	200	於植株定 植後第 20 天及 第 40 天 行根部灌 注。				3		
番茄	根瘤線 蟲	4.8 公 升	250				移植當 日應開 溝 15 公 分，以 5% 毆殺 滅粒劑 條施之， 用藥量 每公頃 20 公			

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
							斤。在移植後第20天及40天，再以10%毆殺滅溶液行葉面施藥。			
瓜果類	番茄斑潛蠅		250	害蟲發生時開始施藥。	7-10			6		
柑桔類	柑桔潛葉蛾	2.4-7.2公升	350	萌芽時施藥。	7			7	五月至九月新芽萌發時每七日施藥一次。	
柑桔類	銹蟬類	2.4-7.2公升	350	害蟬發生時開始施藥。	21			7		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	本項新增。
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。	本項新增。