

「四氣異苯腈」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713F 號公告修正

40% 四氣異苯腈 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	炭疽病	1.7-2 公 升	300	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
落花生	葉斑病	1.7 公升	700	病害發生 初期開始 施藥。	7-10	4		7		
落花生	銹病	1.3 公升	600	病害發生 初期開始 施藥。	10	4		7	本藥劑試驗 時加展著劑 「全透力」 (Totalwatt) 。	
向日葵	炭疽病	0.8-3.1 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	葵瓜子採收 前 7 天停止 施藥。	
胡麻	疫病	2-4 公 升	300	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	避免與油劑 混合使用。	
十字花 科包葉 菜類	黑斑病	0.9-3.3 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	10	3-4		21		
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.8-3.1 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
結球白 菜	黑斑病	4.2-4.9 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	10	3-4		21		
結球莴 苣	炭疽病	0.8-3.1 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		本項修 正。
豆科小 葉菜類	炭疽病	1.7-2.7 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
十字花	黑斑病	0.9-3.3	300	病害發生	10	3-4		7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
科小葉菜類		公升		初期開始施藥。						
十字花科小葉菜類	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
小白菜	黑斑病	4.2-4.9公升	300	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
油菜	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7	<u>適用於油菜籽。</u>	本項修正。
菊科小葉菜類	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蔥科小葉菜類	紫斑病	2.5-6.3公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蔥科小葉菜類	炭疽病	2.5-6.3公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
葫蘆科小葉菜類	露菌病	1-1.2公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	3	<u>藥液應噴施於葉片上下兩面。</u>	7		本項修正。
葫蘆科小葉菜類	炭疽病	2.5-6.3公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菠菜	炭疽病	0.8-2.3公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山蘇	炭疽病	0.8-3.3公升	300	病害發生初期開始施藥。	7			12		
豆科根菜類	炭疽病	1.7-2.7公升	300	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	3.1-4.7	320	病害發生	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		初期開始 施藥。						
十字花 科根菜 類	炭疽病	0.8-3.1 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
菊科根 菜類	炭疽病	0.8-3.1 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
馬鈴薯	晚疫病	3-4 公 升	300	病害發生 初期開始 施藥。	5			7		
蔥科根 菜類	紫斑病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
蔥科根 菜類	炭疽病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
洋蔥	紫斑病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
番茄	晚疫病	3-4 公 升	300	病害發生 初期開始 施藥。	5-7			7		
瓜菜類	露菌病	1-1.2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7		<u>藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。</u>	14		本項修 正。
瓜菜類	炭疽病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
胡瓜	露菌病	5-7.5 公 升	200	病害發生 初期開始 施藥。	7		<u>藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。</u>	14		本項修 正。
<u>菜豆、 豌豆、 花豆、</u>	炭疽病	1.7-2.7 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	<u>適用於鮮 豆。</u>	本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
樹豆、 菜豆、 蠶豆、 扁豆、 翼豆、 刀豆、 豇豆										
大豆	炭疽病	1.7-2.7 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於毛 豆。	本項修 正。
洋香瓜	露菌病	1-1.2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		14		本項恢 復為原 登記作 物品項。
瓜果類	露菌病	1-1.2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7		藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。	14		本項修 正。
瓜果類	炭疽病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
草莓	炭疽病	2.5-6.3 公升	320	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
葡萄	銹病		300	病害發生 初期開始 施藥。	10	4		30		
桃	銹病	3.3-6.8 公升	300	病害發生 初期開始 施藥。	10			21		
桃	縮葉病		700	萌芽前 7 天內施 藥。	7-10	4-5		21		
柑桔類	黑星病		200	1. 落花 後 1 星期 至 8					1. 須經常 清除並 燒燬果 園內之	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				月中旬施藥。 2. 如遇下雨時，每隔1~2週施藥一次。					枯枝與落葉。 2. 如無雨時，施藥間隔可酌情延長。	
菊	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋甘菊	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			14		
風茹	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			14		
艾草	炭疽病	0.8-3.1公升	320	病害發生初期開始施藥。	7			14		
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。	本項新增。

75% 四氯異苯腈 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	炭疽病	0.8-1公升	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
落花生	葉斑病	1.5公斤	400				藥液應		加展著劑	本項修

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
							噴 施 於 葉 片 上 下 兩 面。		「TOTALW ETT」1,000 倍。	正。
落花生	銹病	0.65 公 斤	1,200	病害發生 初期開始 施藥。	10	4		7	本藥劑試驗 時加展著劑 「全透力」 (Totalwatt) 。	
向日葵	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	葵瓜子採收 前 7 天停止 施藥。	
胡麻	疫病	1-2 公 斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	避免與油劑 混合使用。	
十字花 科包葉 菜類	黑斑病	0.4-1.4 公斤	700	病害發生 初期開始 施藥。	10	3-4		21		
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
結球白 菜	黑斑病	1.8-2.1 公斤	700	病害發生 初期開始 施藥。	10	3-4		7		
結球莴 苣	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		本 項 修 正。
豆科小 葉菜類	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
十字花 科小葉 菜類	黑斑病	0.4-1.4 公斤	700	病害發生 初期開始 施藥。	10	3-4		12		
十字花 科小葉 菜類	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
小白菜	黑斑病	1.8-2.1 公斤	700	病害發生 初期開始	10	3-4		7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
油菜	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	本項修正。
菊科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蔥科小葉菜類	紫斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
蔥科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
葫蘆科小葉菜類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		本項修正。
葫蘆科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菠菜	炭疽病	0.4-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山蘇	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			12		
豆科根菜類	炭疽病	0.8-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	1.7-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
十字花科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
菊科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始	7			14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
馬鈴薯	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5			7		
蔥科根菜類	紫斑病	1.8-2.1 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			14		
蔥科根菜類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋蔥	紫斑病	2.5-3 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7			14	施藥時應加展著劑。	
番茄	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5-7			7		
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7		藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項修正。
瓜菜類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
胡瓜	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7		藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項修正。
<u>菜豆、豌豆、</u>	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生初期開始	7			6	<u>適用於鮮豆。</u>	本項修正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
花豆、 樹豆、 菜豆、 蠶豆、 扁豆、 翼豆、 刀豆、 豇豆				施藥。						
大豆	炭疽病	0.8-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			6	適用於毛豆。	本項修正。
瓜果類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		重複範圍，本項刪除。
瓜果類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		重複範圍，本項刪除。
瓜果類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7		藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項修正。
瓜果類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
西瓜	炭疽病	1.6-2.0公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	4-5	藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項恢復為原登記作物品項。
香蕉	葉斑病	1.5公斤	加水至30L/Ha	病害發生初期開始施藥。				14	使用本藥劑不可加展著劑及混合礦物油使用，以免發生藥害。	
草莓	炭疽病	1.3-3.3	600	病害發生	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始 施藥。						
葡萄	銹病		600	病害發生 初期開始 施藥。	10	4		30	本藥劑試驗 時加展著劑 「來著通 CS-7」3,000 倍。	
桃	銹病	1.4-2.9 公斤	700	病害發生 初期開始 施藥。	10			21		
桃	縮葉病		1,400	萌芽前 7 天 內 施 藥。	7-10	4-5		21		
柑桔類	黑星病		500	落花後施 藥。						
菊	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
洋甘菊	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
風茹	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
艾草	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植 物檢疫物檢 疫處理消毒 方法」之規 定處理。	本項新 增。

75% 四氯異苯腈 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	炭疽病	0.8-1 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
落花生	葉斑病	1.5 公斤	400				藥液應噴施於葉片上下兩面。		加展著劑「TOTALWETT」1,000倍。	本項修正。
落花生	銹病	0.65 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥。	10	4		7	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」(Totalwatt)。	
向日葵	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	葵瓜子採收前 7 天停止施藥。	
胡麻	疫病	1-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	避免與油劑混合使用。	
十字花科包葉菜類	黑斑病	0.4-1.4 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		21		
十字花科包葉菜類	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			21		
結球白菜	黑斑病	1.8-2.1 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
結球萵苣	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			21		本項修正。
小葉菜類	葉斑病	0.4-1.4 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			12		
豆科小葉菜類	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科小葉菜類	黑斑病	0.4-1.4公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		12		
十字花科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
小白菜	黑斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
油菜	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	本項修正。
菊科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蔥科小葉菜類	紫斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
蔥科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
葫蘆科小葉菜類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		本項修正。
葫蘆科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菠菜	炭疽病	0.4-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山蘇	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			12		
豆科根菜類	炭疽病	0.8-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
山藥	炭疽病	1.7-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
十字花科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
菊科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
馬鈴薯	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5			7		
蔥科根菜類	紫斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			14		
蔥科根菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋蔥	紫斑病	2.5-3 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7			14	施藥時應加展著劑。	
番茄	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5-7			7		
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7		藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項修正。
瓜菜類	炭疽病	1.3-3.3	600	病害發生	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始 施藥。						
胡瓜	露菌病	2-3 公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7		藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。	14		本項修 正。
菜豆、 豌豆、 花豆、 樹豆、 菜豆、 蠶豆、 扁豆、 翼豆、 刀豆、 豇豆	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於鮮 豆。	本項修 正。
大豆	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於毛 豆。	本項修 正。
瓜果類	露菌病	2-3 公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。	14		重複範 圍，本項 刪除。
瓜果類	露菌病	2-3 公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面	14		重複範 圍，本項 刪除。
瓜果類	露菌病	2-3 公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7		藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。	14		本項修 正。
瓜果類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
西瓜	炭疽病	1.6-2.0 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	4-5	藥液應 噴施於 葉片上	14		本項恢 復為原 登記作

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							下兩面。			物品項。
香蕉	葉斑病	1.5 公斤	加水至 30L/Ha	病害發生初期開始施藥。				14	使用本藥劑不可加展著劑及混合礦物油使用，以免發生藥害。	
草莓	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			10		
葡萄	銹病		600	病害發生初期開始施藥。	10	4		30	本藥劑試驗時加展著劑「來著通 CS-7」3,000 倍。	
桃	銹病	1.4-2.9 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			21		
桃	縮葉病		1,400	萌芽前 7 天內施藥。	7-10	4-5		21		
柑桔類	黑星病		500	落花後施藥。						
菊	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋甘菊	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
風茹	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
艾草	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
輸入植物檢疫	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢驗	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
物									疫處理消毒方法」之規定處理。	

75% 四氯異苯腈 可濕性粉劑-水溶性袋裝 (WPSB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	炭疽病	0.8-1 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
落花生	葉斑病	1.5 公斤	400				藥液應噴施於葉片上下兩面。		加展著劑「TOTALWETT」1,000倍。	本項修正。
落花生	銹病	0.65 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥。	10	4		7	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」(Totalwatt)。	
向日葵	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	葵瓜子採收前 7 天停止施藥。	
胡麻	疫病	1-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	避免與油劑混合使用。	
十字花科包葉菜類	黑斑病	0.4-1.4 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		21		
十字花科包葉菜類	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			21		
結球白菜	黑斑病	1.8-2.1 公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
結球萵	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生	7			21		本項修

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
苣		公斤		初期開始施藥。						正。
小葉菜類	葉斑病	0.4-1.4公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			12		
豆科小葉菜類	炭疽病	0.8-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			12		
十字花科小葉菜類	黑斑病	0.4-1.4公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		12		
十字花科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
小白菜	黑斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
油菜	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	本項修正。
菊科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蔥科小葉菜類	紫斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10	3-4		7		
蔥科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
葫蘆科小葉菜類	露菌病	2-3公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		本項修正。
葫蘆科小葉菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菠菜	炭疽病	0.4-1.3公斤	600	病害發生	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始施藥。						
山蘇	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			12		
豆科根菜類	炭疽病	0.8-1.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	1.7-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
十字花科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
菊科根菜類	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
馬鈴薯	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5			7		
蔥科根菜類	紫斑病	1.8-2.1公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			14		
蔥科根菜類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋蔥	紫斑病	2.5-3 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7			14	施藥時應加展著劑。	
番茄	晚疫病	1.5-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	5-7			7		
瓜菜類	露菌病	2-3 公斤	500	病害發生初期開始施藥。	7	3-4	藥液應噴施於葉片上下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	露菌病	2-3 公	500	病害發生	7		藥液應	14		本項修

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		斤		初期開始施藥。			<u>噴施於葉片上下兩面。</u>			正。
瓜菜類	露菌病	2-3公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。	7		重複範圍，本項刪除。
瓜菜類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
胡瓜	露菌病	2-3公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7		<u>藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。</u>	14		本項修正。
<u>菜豆、 豌豆、 花豆、 樹豆、 菜豆、 蠶豆、 扁豆、 翼豆、 刀豆、 豇豆</u>	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	<u>適用於鮮 豆。</u>	本項修正。
<u>大豆</u>	炭疽病	0.8-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	<u>適用於毛 豆。</u>	本項修正。
瓜果類	露菌病	2-3公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面	14		重複範圍，本項刪除。
瓜果類	露菌病	2-3公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7		<u>藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。</u>	14		本項修正。
瓜果類	露菌病	2-3公 斤	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於	14		重複範圍，本項

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。			葉片上 下兩面。			刪除。
西瓜	炭疽病	1.6-2.0公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	4-5	藥液應噴施於葉片上下兩面。	14		本項恢復為原登記作物品項。
瓜果類	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
香蕉	葉斑病	1.5公斤	加水至30L/Ha	病害發生初期開始施藥。				14	使用本藥劑不可加展著劑及混合礦物油使用，以免發生藥害。	
草莓	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			10		
葡萄	銹病		600	病害發生初期開始施藥。	10	4		30	本藥劑試驗時加展著劑「來著通CS-7」3,000倍。	
桃	銹病	1.4-2.9公斤	700	病害發生初期開始施藥。	10			21		
桃	縮葉病		1,400	萌芽前7天內施藥。	7-10	4-5		21		
柑桔類	黑星病		500	落花後施藥。						
菊	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		
洋甘菊	炭疽病	0.4-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
風茹	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
艾草	炭疽病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植 物檢疫物檢 疫處理消毒 方法」之規 定處理。	本項新 增。