

「得恩地」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713M 號公告修正

40% 得恩地 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	痘病	4-5 公升	500	開花初期開始施藥。	7			30	最後一次施藥後，藥液乾後即套袋。	

65% 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	晚腐病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.7-5.0 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	2.0-3.3 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
桃	縮葉病		160	病害發生初期開始施藥。					使用時加展著劑。	
鐘麻	腰折病	17-18 公斤	1,000	播種前施藥。						

80% 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	晚腐病	1-2 公 斤	800	謝花幼果 期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1-2 公 斤	800	謝花幼果 期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公斤	800	謝花幼果 期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公斤	800	謝花幼果 期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1-2 公 斤	800	謝花幼果 期施藥。	7			15		
檬果	炭疽病		800	開花初期 施藥。				30	1. 開花初 期開始 施藥， 以後每 隔 7 天 施藥 1 次，連 續 4 次。 2. 結果後 每隔 14 天 施藥 1 次，至 套袋為 止。	
桃	縮葉病		200	病害發生 初期開始 施藥。					使用時加展 著劑。	
鐘麻	腰折病		1,200	病害發生 初期開始 施藥。						
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理 時施藥 1 次。			確定藥 劑密布 全株。		施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
觀賞植	苗檢疫			檢疫處理			確定藥		施藥量及稀	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
物	處理			時施藥 1 次。			劑 密 布 全株。		釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
蔬菜	種子檢 疫處理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植 物檢疫物檢 疫處理消毒 方法」之規 定處理。	本項新 增。