

「嘉賜銅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713D 號公告修正

77.5% 嘉賜銅 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
芋	疫病			病害發生 初期開始 施藥。	7	2		6		
瓜菜類	露菌病	1-1.5 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。		藥液加展著 劑「來著通」 2,000 倍。	
胡瓜	露菌病	1-1.5 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4	藥液應 噴施於 葉片上 下兩面。		本藥劑試驗 時加展著劑 「加效寶」 或「來著通 CS-7」2,000 倍。	
檬果	細菌性 黑斑病		1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		6		
茶	枝枯病	3.0 公斤	1,000	剪枝或採 茶後立即 施藥。	7-10	2		14		
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。		1			施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	

81.3% 嘉賜銅 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
甘藍	黑腐病	1-1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
蔥 科 小 葉 菜 類	紫斑病	1.25 公 斤	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
蒜	紫斑病	1.25 公 斤	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
蔥	疫病	1.5-2.5 公斤	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	2		6		
蔥	細菌性 軟腐病	1.5-2.5 公斤	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	2		6		
蔥 科 根 菜 類	紫斑病	1.25 公 斤	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
洋蔥	細菌性 軟腐病	1-1.2 公 斤	1,000	洋蔥定植 後 10 天 施藥。	7	2		12	洋蔥生長 3 個月後，再 每隔 7 天施 藥 1 次，連 續 3 次。	
芋	疫病			病害發生 初期開始 施藥。	7	2		6		
番茄	早疫病	1-1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		3		
番茄	細菌性 斑點病	1-1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
番茄	潰瘍病	1-1.2 公 斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		6		
甜椒	細菌性	1 公斤	1,000	病害發生	7	3		3		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	斑點病			初期開始 施藥。						
木瓜	疫病		1,000	雨季來臨 時施藥。	10			6		
百香果	疫病	0.8-1.6 公斤	1,000	雨季來臨 前開始施 藥。	7	共 2 次		6		
蓮霧	疫病		750	開花盛期 施藥。	7		施藥至 套袋前 為止	6		
檬果	細菌性 黑斑病		1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		6		
柑桔類	潰瘍病	2.5 公斤	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	21	4				
茶	枝枯病	3.0 公斤	1,000	剪枝或採 茶後立即 施藥。	7-10	2		14	加展著劑力 道威 3,000 倍。	
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。	-	1			施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植 物檢疫物檢 疫處理消毒 方法」之規 定處理。	本項新 增。