

## 「腐絕」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 5 月 20 日農授防字第 1101488713G 號公告修正

41.8%腐絕 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量       | 稀釋倍數  | 使用時期              | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法                                   | 安全採收期(天) | 注意事項                          | 說明 |
|------|------|---------------|-------|-------------------|---------|-------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|----|
| 水稻   | 徒長病  |               | 2,000 | 催芽前施藥。            |         |       | 浸藥 24 小時消毒後再浸水催芽。                      |          | 限育苗箱秧苗使用。藥液可以連續使用二次。          |    |
| 水稻   | 消毒   |               | 2,000 | 萌芽時(防徒長病)         |         |       | 1. 浸藥時間：1-6 小時。<br>2. 稻種預先浸水催芽，以藥劑浸漬之。 |          | 1. 消毒後即可播種。<br>2. 藥液可以連續使用二次。 |    |
| 落花生  | 冠腐病  | 每公斤種子施 0.5 毫升 |       |                   |         |       | 播種前剝殼拌種。                               |          | 限拌種使用。                        |    |
| 甘藷   | 基腐病  | 4 公升          | 1,000 | 栽培初期於植株地基部澆灌 1 次。 | 7       | 共 3 次 |                                        | 9        |                               |    |
| 山藥   | 葉斑病  | 0.8-1.2 公升    | 1,000 | 病害發生初期開始施藥。       | 7       | 4     |                                        | 9        | 噴藥後零餘子不得採收。                   |    |
| 山藥   | 莖枯病  | 0.8-1.2 公升    | 1,000 | 病害發生初期開始施藥。       | 7       | 4     |                                        | 9        | 噴藥後零餘子不得採收。                   |    |
| 蘆筍   | 莖枯病  | 0.5 公升        | 3,000 | 割除老株後 7 天施        | 20      | 3     |                                        | 3        | 本藥劑試驗使用展著劑                    |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱     | 每公頃每次用量  | 稀釋倍數        | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                     | 安全採收期(天) | 注意事項                                                | 說明 |
|------|----------|----------|-------------|-------------|---------|------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----|
|      |          |          |             | 藥。          |         |      |                          |          | 「出來通CS-7」5,000倍。                                    |    |
| 蘆筍   | 褐斑病      | 0.7 公升   | 2,000       | 七八月間施藥。     | 20      |      |                          | 3        | 需加強透力展著 5,000 倍稀釋液。                                 |    |
| 洋菇   | 褐斑病      | 1-2 毫升/坪 | 1,000-3,000 | 病害發生初期開始施藥。 |         |      | 如為預防發病，於菇床覆土後每坪施用 1G 藥量。 |          | 1. 2-3 週後如再發病時，可再施藥一次。<br>2. 可同時防治褐斑病、綠黴病、褐腐病、白黴病等。 |    |
| 洋菇   | 褐痘病      | 2 公撮/坪   | 1,000       | 發病時隨時施藥。    |         |      |                          |          | 於 14-21 天後如有再發病再施藥一次。                               |    |
| 香蕉   | 真菌及類真菌病害 | 90 毫升    | 1,000       | 病害發生初期開始施藥。 |         |      |                          |          | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉   | 炭疽病      | 90 毫升    |             | 花苞脫落後施藥。    | 7       | 2    |                          |          | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉   | 黑星病      | 90 毫升    |             | 花苞脫落後施藥。    | 7       | 2    |                          |          | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉   | 黑點病      | 90 毫升    |             | 花苞脫落後施藥。    | 7       | 2    |                          |          | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉   | 軸腐病      |          | 1,000-2,000 | 包裝前施藥。      |         |      | 將果把浸漬藥液內二分鐘或果軸向上放置，將     |          | 藥液處理 150 箱後加半量藥劑。                                   |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                      | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                                                                      | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|          |          |                 |          |                           |                 |          | 藥液噴佈其上。  |                  |                                                                           |    |
| 香蕉       | 水銹       | 90 毫升           |          | 花苞脫落後施藥。                  | 7               | 2        |          |                  | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                                         |    |
| 酪梨       | 炭疽病      |                 | 1,000    | 開花結果期及套袋前施藥。              | 10-14           | 各 2 次    |          | 6                |                                                                           |    |
| 梨果類      | 輪紋病      |                 | 1,200    | 二月下旬及三月上旬落花後或幼果初形成前，開始噴藥。 | 10              |          |          | 6                | 1. 開花期中請勿施藥。<br>2. 於試驗時添加展著劑「強展一號」1,200 倍。<br>3. 三月以後至果實形成期間，若乾旱不降雨則無需施藥。 |    |
| 梨        | 輪紋病      |                 | 1,200    | 落花後或幼果初形成前施藥。             | 10              |          |          | 6                | 1. 開花期中請勿施藥。<br>2. 果實形成期間，若乾旱不雨均不需施藥。                                     |    |
| 柑桔類      | 綠黴病      |                 | 500      | 果實包裝前施藥。                  |                 |          |          |                  | 防治柑桔果實綠黴病、蒂                                                               |    |

| 作物名稱    | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期         | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                     | 說明    |
|---------|------|---------|------|--------------|---------|------|------|----------|--------------------------|-------|
|         |      |         |      |              |         |      |      |          | 腐病。                      |       |
| 柑桔類     | 黑點病  |         | 500  | 果實包裝前施藥。     |         |      |      |          | 防治柑桔果實綠黴病、蒂腐病。           |       |
| 蘭科作物    | 檢疫處理 |         |      | 檢疫處理時施藥 1 次。 |         | 1    |      |          | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。       |       |
| 輸入植物檢疫物 | 檢疫處理 |         |      |              |         |      |      |          | 依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。 | 本項新增。 |

#### 11.7%腐絕 片劑 (TB)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量                       | 稀釋倍數 | 使用時期   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                                          | 安全採收期(天) | 注意事項    | 說明 |
|------|------|-------------------------------|------|--------|---------|------|-----------------------------------------------|----------|---------|----|
| 洋菇菇舍 | 消毒   | 5-6 錠/棟 (200cm <sup>3</sup> ) |      | 覆土後發菇前 |         |      | 覆土後發菇前將本藥劑平均放置於菇舍內，於封閉狀況下點燃燻蒸，封閉 24 小時進行菇舍消毒。 |          | 可預防褐斑病。 |    |

#### 40%腐絕 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數  | 使用時期   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法         | 安全採收期(天) | 注意事項                   | 說明 |
|------|------|---------|-------|--------|---------|------|--------------|----------|------------------------|----|
| 水稻   | 徒長病  |         | 1,500 | 催芽時施藥。 |         | 2    | 浸藥時間為 24 小時。 |          | 限育苗箱秧苗使用。稻種直接消毒後再浸水催芽。 |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數        | 使用時期             | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法                                  | 安全採收期(天) | 注意事項                    | 說明 |
|------|------|------------|-------------|------------------|---------|-------|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|
| 水稻   | 消毒   |            | 2,000       | 萌芽時。             |         | 2     | 1. 稻種預先浸水催芽，以藥劑浸漬之。<br>2. 浸藥時間為1-6小時。 |          | 1.消毒後即可播種。2.藥液可以連續使用二次。 |    |
| 落花生  | 冠腐病  | 每公斤種子施0.5g |             |                  |         |       | 播種前剝殼拌種。                              |          | 限拌種使用。                  |    |
| 甘藷   | 基腐病  | 4 公斤       | 1,000       | 栽培初期於植株地基部澆灌1 次。 | 7       | 共 3 次 |                                       | 9        |                         |    |
| 山藥   | 葉斑病  | 0.8-1.2 公斤 | 1,000       | 病害發生初期開始施藥。      | 7       | 4     |                                       | 9        | 噴藥後零餘子不得採收。             |    |
| 山藥   | 莖枯病  | 0.8-1.2 公斤 | 1,000       | 病害發生初期開始施藥。      | 7       | 4     |                                       | 9        | 噴藥後零餘子不得採收。             |    |
| 蘆筍   | 莖枯病  | 0.75 公斤    | 2,000       | 割除老株後 7 天施藥。     | 20      | 3     |                                       | 3        | 加展著劑「出來通CS-7」2,000倍。    |    |
| 蘆筍   | 褐斑病  | 0.7 公斤     | 2,000       | 七八月間施藥。          | 20      |       |                                       | 3        | 需加強透力展著 5,000倍稀釋液。      |    |
| 洋菇   | 褐斑病  | 1-2G/坪     | 1,000-3,000 | 病害發生初期開始施藥。      |         |       | 如為預防發病，於菇床覆土                          |          | 1. 2-3 週後如再發病           |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數    | 使用時期        | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法                 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                                                | 說明 |
|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----|
|          |          |                 |             |             |                 |          | 後每坪施用 1G 藥量。             |                  | 時，可再施藥一次。<br>2. 可同時防治褐斑病、綠黴病、褐腐病、白黴病等。              |    |
| 洋菇       | 褐痘病      | 1-2G/坪          | 1,000-3,000 | 病害發生初期開始施藥。 |                 |          | 如為預防發病，於菇床覆土後每坪施用 1G 藥量。 |                  | 1. 2-3 週後如再發病時，可再施藥一次。<br>2. 可同時防治褐斑病、綠黴病、褐腐病、白黴病等。 |    |
| 香蕉       | 真菌及類真菌病害 | 90G             | 1,000       | 病害發生初期開始施藥。 |                 |          |                          |                  | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉       | 炭疽病      | 90G             |             | 花苞脫落後施藥。    | 7               | 2        |                          |                  | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |
| 香蕉       | 黑星病      | 90G             |             | 花苞脫落後施藥。    | 7               | 2        |                          |                  | 加展著劑「來著通」90 公撮使用。                                   |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法                                                                                                                       | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                         | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----|
| 香蕉       | 黑點病      | 90G             |          | 花苞脫落<br>後施藥。         | 7               | 2        |                                                                                                                                |                  | 加展著劑<br>「來著通」<br>90公撮使<br>用。 |    |
| 香蕉       | 軸腐病      |                 |          |                      |                 |          | 1. 稀釋<br>250<br>倍，<br>使用<br>毛刷<br>將藥<br>液塗<br>於軸<br>口部<br>分。<br>2. 若稀<br>釋<br>2,000<br>倍，<br>則將<br>果把<br>手浸<br>漬藥<br>劑三<br>分鐘。 |                  |                              |    |
| 香蕉       | 水銹       | 90G             |          | 花苞脫落<br>後施藥。         | 7               | 2        |                                                                                                                                |                  | 加展著劑<br>「來著通」<br>90公撮使<br>用。 |    |
| 酪梨       | 炭疽病      |                 | 1,000    | 開花結果<br>期及套袋<br>前施藥。 | 10-14           | 各 2<br>次 |                                                                                                                                | 6                |                              |    |
| 梨        | 輪紋病      |                 | 1,200    | 落花後或<br>幼果初形<br>成前施  | 10              |          |                                                                                                                                | 6                | 1. 開花期<br>中請勿<br>施藥          |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期         | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                  | 說明 |
|------|------|---------|------|--------------|---------|------|------|----------|-----------------------|----|
|      |      |         |      | 藥。           |         |      |      |          | 2. 果實形成期間，若乾旱不雨均不需施藥。 |    |
| 柑桔類  | 綠黴病  |         | 500  | 果實包裝前施藥。     |         |      |      |          | 防治柑桔果實綠黴病、蒂腐病。        |    |
| 柑桔類  | 黑點病  |         | 500  | 果實包裝前施藥。     |         |      |      |          | 防治柑桔果實綠黴病、蒂腐病。        |    |
| 蘭科作物 | 檢疫處理 |         |      | 檢疫處理時施藥 1 次。 |         | 1    |      |          | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。    |    |

60%腐絕 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量  | 稀釋倍數  | 使用時期      | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                                             | 安全採收期(天) | 注意事項                              | 說明 |
|------|------|----------|-------|-----------|---------|------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----|
| 香菇   | 綠黴病  | 0.1G/ 段木 | 1,000 | 接種後 3 日施藥 | 15      | 3    | 亦可用藥 0.2G/ 每包 (KG) 加入米糠充分混合後再與 9 倍量木屑充份混合加以裝包消毒。 | 6        | 1. 稀釋水量可視段木含水量增減。<br>2. 梅雨期須噴灑一次。 |    |

90%腐絕 可溼性粉劑 (WP)

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數        | 使用時期       | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法                                   | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意<br>事項 | 說明 |
|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|------------------|----------|----|
| 香蕉       | 軸腐病      |                 | 2,300-<br>4,600 | 包裝前施<br>藥。 |                 |          | 將果把浸漬藥<br>液內二分鐘或<br>果軸向上放置<br>將藥液噴佈其<br>上。 |                  |          |    |