

「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 5 月 4 日農授防字第 1091488539I 號公告

中華民國 110 年 6 月 1 日農授防字第 1101489024B 號公告

1×10^9 CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑(WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
水稻	白葉枯 病	1.67 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次			全株均 勻噴 施。	
油菜	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次			適用於 油菜 籽。	
十字 花科 包葉 菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
十字 花科 小葉 菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
十字 花科 根菜 類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
草莓	灰黴病	2 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥，每隔 7 天施藥一 次，連續三 次；進一步 施藥則視病 害發展和藥 劑的持效期 而定。					藥液須 均勻噴 施於植 株全 株。	
檬果	黑斑病	2 公斤	600	葉部發病初 期開始，每 隔 7 天施藥						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				一次，連續 3 次。幼果 形成後開始 施藥，每隔 7 天施藥一 次，連續 4 次。						
柿	灰黴病	1.66 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥，每隔 7 天施藥一 次，連續三 次；進一步 施藥則視病 害發展和藥 劑的持效期 而定。					藥液須 均勻噴 施於植 株全 株。	
<u>蓮霧</u>	<u>炭疽病</u>	<u>5 公斤</u>	<u>600</u>	<u>開花盛期開 始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續 4-5 次</u>				本項新 增。原始 登記廠 商名稱： 亞亮生 技股份 有限公 司
<u>茶</u>	<u>赤葉枯 病</u>	<u>1.67 公斤</u>	<u>600</u>	<u>病害發生初 期開始施 藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續 4 次</u>				本項新 增。原始 登記廠 商名稱： 亞亮生 技股份 有限公 司