草莓葉枯病緊急防治藥劑與使用方法及其範圍

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
53%腐絕快得寧 WP	0.8-1.0 公斤	1,200	育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次。	採收前 5 天停止施藥。
24.9%待克利 EC	0.3-0.4 公升	3,000	育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次。	採收前 5 天停止施藥。
250 G/L (25% W/V) 待克利 EC	0.3-0.4 公升	3,000	育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次。	採收前 5 天停止施藥。
24.9%待克利 SC	0.3-0.4 公升	3,000	育苗期葉片出現病斑時施藥。移植本田後每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次。	採收前 5 天停止施藥。
10%待克利 WG	0.7-1.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥。	採收前 5 天停止施藥。
62.5%賽普護汰寧 WG	0.5 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 5 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
23.6%百克敏 EC	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 9 天停止施藥。
23.6%百克敏 SC	0.3-0.4 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 9 天停止施藥。
23.7%依普同 SC	1-1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 3 天停止施藥。
50%依普同 WP	0.8-1 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	採收前 4 天停止施藥。
25%普克利 EC	0.4-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 6 天停止施藥。
250 G/L (25% W/V) 普克利 EC	0.4-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	採收前 6 天停止施藥。