

「賽派芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299Q 號公告修正

30% 賽派芬 水懸劑(SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
木瓜	葉蟬類	0.8 公升	2,500	於葉蟬發生達 每葉 10 隻時施 藥 1 次。				3		
茶	葉蟬類	0.4 公升	5,000	葉蟬每葉發生 達 3-5 隻時開 始施藥。	7	最多 2 次		14	適用於 茶葉。	
香蕉	葉蟬類	0.11-0.36 公升	2,500	害蟬發生初期 開始施藥 1 次。				7		本項新 增。
百香果	葉蟬類	0.32-0.64 公升	2,500	害蟬發生初期 開始施藥 1 次。				7		本項新 增。
番荔枝	葉蟬類	0.25-0.6 公升	2,500	害蟬發生初期 開始施藥 1 次。				7		本項新 增。
檬果	葉蟬類	0.36-0.8 公升	2,500	害蟬發生初期 開始施藥 1 次。				7		本項新 增。