

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299R 號公告修正

10.2% 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶籽。	查 未 訂 有 農 藥 殘 留 容 許 量 標 準，本項刪除。
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶籽。	
油茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21		
油茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21		
山茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	

10.26% 賽安勃 水分散性油懸劑(OD)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜菜類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開 始施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升 /公頃， 藥劑量 0.625 公 升 / 公 頃。	4	避免於開花 期使用。	本項新增。原始 登記廠 商名稱：台灣 富美實公 司。
瓜果類	粉蝨類	0.625 公升	800	平均每葉 成蟲數達 1 隻以上 1 週後開 始施藥。	7	連續 2 次	藥液量 500 公升 /公頃， 藥劑量 0.625 公 升 / 公 頃。	4	避免於開花 期使用。	本項新增。原始 登記廠 商名稱：台灣 富美實公 司。