

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年4月14日  
發文字號：農授防字第1111488629A號



主旨：公告「派本克」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

## 「派本克」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 14 日農授防字第 1111488629A 號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱      | IUPAC/有效成分                                                                         |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 派本克  | pyribencarb | methyl {2-chloro-5-[(1E)-1-(6-methyl-2-pyridylmethoxyimino)ethyl]benzyl} carbamate |

### 二、「派本克」農藥使用方法與範圍一覽表


40% 派本克 水分散性粒劑(WG)

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期<br>(天) | 注意<br>事項 | 說明                            |
|----------|----------|--------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|
| 梨        | 黑星病      | 0.4-<br>0.67<br>公斤 | 3,000    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 連續 3<br>次 |          | 14                   |          | 原始登記廠商名<br>稱：臺灣庵原農藥<br>股份有限公司 |

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年4月14日  
發文字號：農授防字第1111488629B號



主旨：公告修正「菲克利」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

# 「菲克利」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 14 日農授防字第 1111488629B 號公告修正

10(%) (w/w) 菲克利 乳劑 (EC)

| 作物名稱                                                                   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量               | 稀釋倍數             | 使用時期                   | 施藥間隔(天)         | 施藥次數                    | 施藥方法 | 安全採收期(天)     | 注意事項                                                     | 說明            |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 水稻                                                                     | 紋枯病  | 0.7-0.8 公升            | 1,500            | 分蘖盛期發病時施藥。             | 14              | 3                       |      | 15           | 插秧後 30 天至 45 天(分蘖盛期)後發病時開始施藥。                            |               |
| 大豆、<br>落花<br>生、綠<br>豆、菜<br>豆、豌<br>豆、花<br>豆、樹<br>豆、豇<br>豆、蠶<br>豆、菜<br>豆 | 白粉病  | 0.15-0.2 公升           | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               | <u>連續<br/>2-3<br/>次</u> |      | 7            | <del>使用範圍：豆科乾豆類</del><br>(紅豆除外)白粉病。<br><br><u>適用於乾豆。</u> | 本項修正。         |
| 落花生                                                                    | 銹病   | 0.4 公升                | 3,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 10              | 4                       |      | 7            |                                                          |               |
| 胡麻                                                                     | 白粉病  | 0.2-0.3 公升            | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               |                         |      | 7            |                                                          |               |
| 蔥科小葉菜類                                                                 | 銹病   | 0.3-0.7 公升            | 3,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7-10            |                         |      | 9            | 不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。                                          |               |
| 韭                                                                      | 銹病   | <del>0.3-0.4 公升</del> | <del>3,000</del> | <del>病害發生初期開始施藥。</del> | <del>7-10</del> |                         |      | <del>9</del> | <del>限使用於韭菜，不得使<br/>用於韭黃及韭菜花。</del>                      | 與大類範圍重疊，本項刪除。 |
| 茭白筍                                                                    | 銹病   | 0.3 公升                | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 14              | 3                       |      | 6            | 1. 本藥劑試驗時加展著                                             |               |

| 作物<br>名稱  | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                         | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                                               | 說明 |
|-----------|----------|----------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           |          |                      |          |                              |                 |          |          |                  | 劑<br>「CS-7<br>來著<br>通」<br>2,000<br>倍。<br>2. 幼苗種<br>植 45<br>天後或<br>株高<br>120 公<br>分以上<br>才開始<br>使用。 |    |
| 甘藷        | 基腐病      | 2.7 公<br>升           | 1,500    | 栽培初期<br>於植株地<br>基部澆灌<br>1 次。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 9                |                                                                                                    |    |
| 蔥科根<br>菜類 | 銹病       | 0.3-<br>0.7 公<br>升   | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 9                | 不得使用於<br>韭黃、韭菜<br>花及蒜苔。                                                                            |    |
| 金針        | 銹病       | 0.3-<br>0.7 公<br>升   | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 6                |                                                                                                    |    |
| 胡瓜        | 白粉病      | 0.25 公<br>升          | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 10              | 3        |          | 14               |                                                                                                    |    |
| 草莓        | 白粉病      | 0.2-<br>0.5 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7               |          |          | 7                |                                                                                                    |    |
| 葡萄        | 白粉病      | 0.15-<br>0.2 公<br>升  | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 12               |                                                                                                    |    |
| 梨         | 白粉病      | 0.15-<br>0.35 公<br>升 | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 12               |                                                                                                    |    |
| 梨         | 黑星病      |                      | 6,000    | 病害發生                         | 7               | 6        |          | 12               |                                                                                                    |    |

| 作物<br>名稱                                                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|------------|-----------|
|                                                                   |          |                      |          | 初期開始<br>施藥。         |                 |           |          |                  |            |           |
| 桃                                                                 | 銹病       |                      | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4         |          | 6                |            |           |
| 桃                                                                 | 白粉病      | 0.15-<br>0.35 公<br>升 | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |           |          | 6                |            |           |
| 桃                                                                 | 縮葉病      |                      | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              |           |          | 6                |            |           |
| 鼠李科<br>梨果類                                                        | 白粉病      |                      | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 |                 |           |          | 6                |            |           |
| 大豆                                                                | 白粉病      | 0.1-<br>0.4 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於毛<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、<br>樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆 | 白粉病      | 0.1-<br>0.4 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |

## 10(%) (w/w) 菲克利 水懸劑 (SC)

| 作物名稱                                                                   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量               | 稀釋倍數             | 使用時期                   | 施藥間隔(天)         | 施藥次數                    | 施藥方法 | 安全採收期(天)     | 注意事項                                             | 說明            |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 水稻                                                                     | 紋枯病  | 0.7-0.8 公升            | 1,500            | 分蘖盛期發病時施藥。             | 14              | 3                       |      | 15           | 插秧後 30 天至 45 天(分蘖盛期)後發病時開始施藥。                    |               |
| 大豆、<br>落花<br>生、綠<br>豆、菜<br>豆、豌<br>豆、花<br>豆、樹<br>豆、豇<br>豆、蠶<br>豆、菜<br>豆 | 白粉病  | 0.15-0.2 公升           | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               | <u>連續<br/>2-3<br/>次</u> |      | 7            | <del>使用範圍：豆科乾豆類(紅豆除外)白粉病。</del><br><u>適用於乾豆。</u> | 本項修正。         |
| 落花生                                                                    | 銹病   | 0.4 公升                | 3,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 10              | 4                       |      | 7            |                                                  |               |
| 胡麻                                                                     | 白粉病  | 0.2-0.3 公升            | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               |                         |      | 7            |                                                  |               |
| 蔥科小葉菜類                                                                 | 銹病   | 0.3-0.7 公升            | 3,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7-10            |                         |      | 9            | 不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。                                  |               |
| 韭                                                                      | 銹病   | <del>0.3-0.4 公升</del> | <del>3,000</del> | <del>病害發生初期開始施藥。</del> | <del>7-10</del> |                         |      | <del>9</del> | <del>限使用於韭菜，不得使<br/>用於韭黃及韭菜花。</del>              | 與大類範圍重疊，本項刪除。 |
| 茭白筍                                                                    | 銹病   | 0.3 公升                | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 14              | 3                       |      | 6            | 1. 本藥劑試驗時加展著劑「CS-7 來著通」                          |               |

| 作物<br>名稱  | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                         | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                     | 說明 |
|-----------|----------|----------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|           |          |                      |          |                              |                 |          |          |                  | 2,000<br>倍。<br>2. 幼苗種<br>植 45<br>天後或<br>株高<br>120 公<br>分以上<br>才開始<br>使用。 |    |
| 甘藷        | 基腐病      | 2.7 公<br>升           | 1,500    | 栽培初期<br>於植株地<br>基部澆灌<br>1 次。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 9                |                                                                          |    |
| 蔥科根<br>菜類 | 銹病       | 0.3-<br>0.7 公<br>升   | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 9                | 不得使用於<br>韭黃、韭菜<br>花及蒜苔。                                                  |    |
| 金針        | 銹病       | 0.3-<br>0.7 公<br>升   | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 6                |                                                                          |    |
| 胡瓜        | 白粉病      | 0.25 公<br>升          | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 10              | 3        |          | 14               |                                                                          |    |
| 草莓        | 白粉病      | 0.2-<br>0.5 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7               |          |          | 7                |                                                                          |    |
| 葡萄        | 白粉病      | 0.15-<br>0.2 公<br>升  | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 12               |                                                                          |    |
| 梨         | 白粉病      | 0.15-<br>0.35 公<br>升 | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 12               |                                                                          |    |
| 梨         | 黑星病      |                      | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7               | 6        |          | 12               |                                                                          |    |
| 桃         | 銹病       |                      | 3,000    | 病害發生<br>初期開始                 | 7               | 4        |          | 6                |                                                                          |    |



| 作物<br>名稱                                                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|------------|-----------|
|                                                                   |          |                      |          | 施藥。                 |                 |           |          |                  |            |           |
| 桃                                                                 | 白粉病      | 0.15-<br>0.35 公<br>升 | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |           |          | 6                |            |           |
| 桃                                                                 | 縮葉病      |                      | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              |           |          | 6                |            |           |
| 鼠李科<br>梨果類                                                        | 白粉病      |                      | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 |                 |           |          | 6                |            |           |
| 大豆                                                                | 白粉病      | 0.1-<br>0.4 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於毛<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、<br>樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆 | 白粉病      | 0.1-<br>0.4 公<br>升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |

## 23(%) (w/w) 菲克利 水懸劑 (SC)

| 作物名稱                                                                   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量                      | 稀釋倍數             | 使用時期                   | 施藥間隔(天)         | 施藥次數                                | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項                                                                | 說明            |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 水稻                                                                     | 紋枯病  | 0.3 公升                       | 4,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 14              | 3                                   | 施藥時應噴灑於稻株葉鞘 | 14       |                                                                     |               |
| 大豆、<br>落花<br>生、綠<br>豆、菜<br>豆、豌<br>豆、花<br>豆、樹<br>豆、豇<br>豆、蠶<br>豆、菜<br>豆 | 白粉病  | 0.07-<br>0.09 公升             | 9,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               | <u>連續</u><br><u>2-3</u><br><u>次</u> |             | 7        | <del>使用範圍：豆科乾豆類</del><br><del>(紅豆除外)白粉病。</del><br><br><u>適用於乾豆。</u> | 本項修正。         |
| 落花生                                                                    | 銹病   | 0.17 公升                      | 7,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 10              | 4                                   |             | 7        |                                                                     |               |
| 胡麻                                                                     | 白粉病  | 0.07-<br>0.13 公升             | 9,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               |                                     |             | 7        |                                                                     |               |
| 蔥科小葉菜類                                                                 | 銹病   | 0.1-<br>0.3 公升               | 6,900            | 病害發生初期開始施藥。            | 7-10            |                                     |             | 9        | 不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。                                                     |               |
| 韭                                                                      | 銹病   | <del>0.13-<br/>0.17 公升</del> | <del>7,000</del> | <del>病害發生初期開始施藥。</del> | <del>7-10</del> |                                     |             | 9        | <del>限使用於韭菜，不得使</del><br><del>用於韭黃及韭菜花。</del>                       | 與大類範圍重疊，本項刪除。 |
| 茭白筍                                                                    | 銹病   | 0.13 公升                      | 9,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 14              | 3                                   |             | 6        | 1. 本藥劑試驗時加展著劑「CS-7來著通」2,000                                         |               |

| 作物<br>名稱  | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期              | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                  | 說明 |
|-----------|----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------|----|
|           |          |                      |          |                   |                 |          |          |                  | 倍。<br>2. 幼苗種植 45 天後或株高 120 公分以上才開始使用。 |    |
| 甘藷        | 基腐病      | 1.1 公升               | 3,500    | 栽培初期於植株地基部澆灌 1 次。 | 7               | 共 3 次    |          | 9                |                                       |    |
| 蔥科根<br>菜類 | 銹病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升   | 6,900    | 病害發生初期開始施藥。       | 7-10            |          |          | 9                | 不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。                       |    |
| 金針        | 銹病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升   | 6,900    | 病害發生初期開始施藥。       | 7-10            |          |          | 6                |                                       |    |
| 胡瓜        | 白粉病      | 0.11 公升              | 9,000    | 病害發生初期開始施藥。       | 10              | 3        |          | 14               |                                       |    |
| 草莓        | 白粉病      | 0.09-<br>0.22 公<br>升 | 9,000    | 病害發生初期開始施藥。       | 7               |          |          | 7                |                                       |    |
| 葡萄        | 白粉病      | 0.06-<br>0.09 公<br>升 | 14,000   | 病害發生初期開始施藥。       | 7-10            |          |          | 12               |                                       |    |
| 梨         | 白粉病      | 0.06-<br>0.15 公<br>升 | 14,000   | 病害發生初期開始施藥。       | 7-10            |          |          | 12               |                                       |    |
| 梨         | 黑星病      |                      | 14,000   | 病害發生初期開始施藥。       | 7               | 6        |          | 12               |                                       |    |
| 桃         | 銹病       |                      | 7,000    | 病害發生初期開始施藥。       | 7               | 4        |          | 6                |                                       |    |

| 作物<br>名稱                                                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數  | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|------------|-----------|
| 桃                                                                 | 白粉病      | 0.06-<br>0.15 公<br>升 | 14,000   | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |           |          | 6                |            |           |
| 桃                                                                 | 縮葉病      |                      | 9,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              |           |          | 6                |            |           |
| 鼠李科<br>梨果類                                                        | 白粉病      |                      | 14,000   | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 |                 |           |          | 6                |            |           |
| 大豆                                                                | 白粉病      | 0.04-<br>0.1<br>公升   | 9,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於毛<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、<br>樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆 | 白粉病      | 0.04-<br>0.1<br>公升   | 9,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 10              | 共 2<br>次。 |          | 9                | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |

## 5(%) (w/w) 菲克利 水懸劑 (SC)

| 作物名稱                                                                   | 病蟲名稱          | 每公頃每次用量               | 稀釋倍數             | 使用時期                   | 施藥間隔(天)         | 施藥次數                    | 施藥方法 | 安全採收期(天)     | 注意事項                                                            | 說明         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 水稻                                                                     | 紋枯病           | 1.4-1.6 公升            | 750              | 分蘖盛期發病時施藥。             | 14              | 3                       |      | 15           | 插秧後 30 天至 45 天(分蘖盛期)後發病時開始施藥。                                   |            |
| 大豆、<br>落花<br>生、綠<br>豆、菜<br>豆、豌<br>豆、花<br>豆、樹<br>豆、豇<br>豆、蠶<br>豆、菜<br>豆 | 白粉病           | 0.3-0.4 公升            | 2,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               | <u>連續<br/>2-3<br/>次</u> |      | 7            | <del>使用範圍：豆科乾豆類</del><br><del>(紅豆除外)白粉病。</del><br><u>適用於乾豆。</u> | 本項修正。      |
| 落花生                                                                    | 銹病            | 0.8 公升                | 1,500            | 病害發生初期開始施藥。            | 10              | 4                       |      | 7            |                                                                 |            |
| 胡麻                                                                     | 白粉病           | 0.3-0.6 公升            | 2,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 7               |                         |      | 7            |                                                                 |            |
| 蔥科小葉菜類                                                                 | 銹病            | 0.5-1.3 公升            | 1,500            | 病害發生初期開始施藥。            | 7-10            |                         |      | 9            | 不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。                                                 |            |
| <del>蔥科小葉菜類</del>                                                      | <del>銹病</del> | <del>0.6-0.8 公升</del> | <del>1,500</del> | <del>病害發生初期開始施藥。</del> | <del>7-10</del> |                         |      | <del>9</del> | <del>不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。</del>                                      | 重複範圍，本項刪除。 |
| 韭                                                                      | 銹病            | 0.6-0.8 公升            | 1,500            | 病害發生初期開始施藥。            | 7-10            |                         |      | 9            | 限使用於韭菜，不得使用於韭黃及韭菜花。                                             |            |
| 茭白筍                                                                    | 銹病            | 0.6 公升                | 2,000            | 病害發生初期開始施藥。            | 14              | 3                       |      | 6            | 1. 本藥劑試驗時加展著劑                                                   |            |

| 作物<br>名稱  | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                         | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                                          | 說明                 |
|-----------|----------|--------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |          |                    |          |                              |                 |          |          |                  | 「CS-7<br>來著<br>通」<br>2,000<br>倍。<br>2. 幼苗種<br>植 45<br>天後或<br>株高<br>120 公<br>分以上<br>才開始<br>使用。 |                    |
| 甘藷        | 基腐病      | 5.3 公<br>升         | 750      | 栽培初期<br>於植株地<br>基部澆灌<br>1 次。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 9                |                                                                                               |                    |
| 蔥科根<br>菜類 | 銹病       | 0.6-<br>0.8 公<br>升 | 1,500    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 9                | 不得使用於<br><del>韭黃、韭菜<br/>花及蒜苔。</del>                                                           | 重複範<br>圍，本項<br>刪除。 |
| 蔥科根<br>菜類 | 銹病       | 0.5-<br>1.3 公<br>升 | 1,500    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 9                | 不得使用於<br>韭黃、韭菜<br>花及蒜苔。                                                                       |                    |
| 金針        | 銹病       | 0.5-<br>1.3 公<br>升 | 1,500    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 6                |                                                                                               |                    |
| 胡瓜        | 白粉病      | 0.5 公<br>升         | 2,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 10              | 3        |          | 14               |                                                                                               |                    |
| 草莓        | 白粉病      | 0.4-1<br>公升        | 2,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7               |          |          | 7                |                                                                                               |                    |
| 葡萄        | 白粉病      | 0.3-<br>0.4 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。          | 7-10            |          |          | 12               |                                                                                               |                    |
| 梨         | 白粉病      | 0.3-<br>0.7 公      | 3,000    | 病害發生<br>初期開始                 | 7-10            |          |          | 12               |                                                                                               |                    |

| 作物<br>名稱                                                                                                                                | 病蟲<br>名稱   | 每公頃<br>每次用<br>量                         | 稀釋<br>倍數     | 使用時期                                     | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數                | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                     | 說明        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |            | 升                                       |              | 施藥。                                      |                 |                         |          |                  |                          |           |
| 梨                                                                                                                                       | 黑星病        |                                         | 3,000        | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                      | 7               | 6                       |          | 12               |                          |           |
| 桃                                                                                                                                       | 銹病         |                                         | 1,500        | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                      | 7               | 4                       |          | 6                |                          |           |
| 桃                                                                                                                                       | 白粉病        | 0.3-<br>0.7 公<br>升                      | 3,000        | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                      | 7               |                         |          | 6                |                          |           |
| 桃                                                                                                                                       | 縮葉病        |                                         | 2,000        | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                      | 10              |                         |          | 6                |                          |           |
| 鼠李科<br>梨果類                                                                                                                              | 白粉病        |                                         | 3,000        | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                      |                 |                         |          | 6                |                          |           |
| <u>大豆</u>                                                                                                                               | <u>白粉病</u> | <u>0.3-</u><br><u>0.8 公</u><br><u>升</u> | <u>2,000</u> | <u>病害發生</u><br><u>初期開始</u><br><u>施藥。</u> | <u>10</u>       | <u>共 2</u><br><u>次。</u> |          | <u>9</u>         | <u>適用於毛</u>              | 本項新<br>增。 |
|                                                                                                                                         |            |                                         |              |                                          |                 |                         |          |                  | <u>豆。</u>                |           |
| <u>刀豆、</u><br><u>花豆、</u><br><u>扁豆、</u><br><u>豇豆、</u><br><u>菜豆、</u><br><u>菜豆、</u><br><u>豌豆、</u><br><u>樹豆、</u><br><u>翼豆、</u><br><u>蠶豆</u> | <u>白粉病</u> | <u>0.3-</u><br><u>0.8 公</u><br><u>升</u> | <u>2,000</u> | <u>病害發生</u><br><u>初期開始</u><br><u>施藥。</u> | <u>10</u>       | <u>共 2</u><br><u>次。</u> |          | <u>9</u>         | <u>適用於鮮</u><br><u>豆。</u> | 本項新<br>增。 |

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年4月14日  
發文字號：農授防字第1111488629C號



主旨：公告修正「賓克隆」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 陳吉仲



## 「賓克隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 14 日農授防字第 1111488629C 號公告修正

### 23.2 (%) (w/w) 賓克隆 水懸劑 (SC)

| 作物<br>名稱         | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量           | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項 | 說明 |
|------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|----|
| 水稻               | 紋枯病      | 0.5 公<br>升                | 2,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                  | 14              | 2        |          | 7                |      |    |
| 十字花<br>科包葉<br>菜類 | 苗立枯<br>病 | 2.5 公<br>升/10<br>平方公<br>尺 | 1,000    | 苗床播種<br>後施藥。                         | 10              | 2        |          | 15               |      |    |
| 旋花科<br>小葉菜<br>類  | 根腐病      | 2.5 公<br>升                | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。 |                 |          |          | 15               |      |    |
| 豆科小<br>葉菜類       | 立枯病      | 2.5 公<br>升                | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。 |                 |          |          | 15               |      |    |
| 豆科小<br>葉菜類       | 苗立枯<br>病 | 2.5 公<br>升                | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。 |                 |          |          | 15               |      |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類 | 苗立枯<br>病 | 2.5 公<br>升/10<br>平方公<br>尺 | 1,000    | 苗床播種<br>後施藥。                         | 10              | 2        |          | 15               |      |    |
| 菊科小<br>葉菜類       | 立枯病      | 2.5 公<br>升                | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。 |                 |          |          | 15               |      |    |
| 茄科小              | 苗立枯      | 2.5 公                     | 1,000    | 苗床播種                                 |                 |          |          | 15               |      |    |

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量      | 稀釋倍數  | 使用時期                | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明                  |
|----------|------|--------------|-------|---------------------|---------|------|------|----------|--------|---------------------|
| 葉菜類      | 病    | 升            |       | 後，或幼苗出現病斑時澆灌1次。     |         |      |      |          |        |                     |
| 蔥科小葉菜類   | 立枯病  | 2.5公升        | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌1次。 |         |      |      | 15       |        |                     |
| 葫蘆科小葉菜類  | 立枯病  | 2.5公升        | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌1次。 |         |      |      | 15       |        |                     |
| 繖形花科小葉菜類 | 莖腐病  | 2.5公升        | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌1次。 |         |      |      | 15       |        |                     |
| 莧科小葉菜類   | 葉枯病  | 2.5公升        | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌1次。 |         |      |      | 15       |        |                     |
| 十字花科根菜類  | 苗立枯病 | 2.5公升/10平方公尺 | 1,000 | 苗床播種後施藥。            | 10      | 2    |      | 15       |        | 查未訂有農藥殘留容許量標準，本項刪除。 |
| 百慕達草     | 褐斑病  | 1.05公升       | 950   | 病害發生初期開始施藥。         | 14      | 3    |      |          |        |                     |
| 大豆       | 苗立枯病 | 0.5-1.5公升    | 1,000 | 播種後澆灌1次，隔10天再施藥1    |         | 共2次  |      |          | 適用於毛豆。 | 本項新增。               |

| 作物<br>名稱                                                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                        | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------|-----------|
|                                                                   |          |                    |          | 次。                                          |                 |          |          |                  |            |           |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、<br>樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆 | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 番茄、<br>甜椒、<br>茄子、<br>辣椒、<br>枸杞、<br>香瓜<br>茄、樹<br>番茄                | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |            | 本項新<br>增。 |
| 瓜菜類                                                               | 苗立枯<br>病 | 0.8-2<br>公升        | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |            | 本項新<br>增。 |
| 馬鈴薯                                                               | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 薯塊定植<br>後澆灌 1<br>次，隔<br>10 天再<br>施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  |            | 本項新<br>增。 |

## 25 (%) (w/w) 賓克隆 水懸劑 (SC)

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量         | 稀釋倍數  | 使用時期                  | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                         | 說明 |
|----------|------|-----------------|-------|-----------------------|---------|------|------|----------|------------------------------|----|
| 水稻       | 紋枯病  | 0.5 公斤          | 2,000 | 病害發生初期開始施藥。           | 14      | 2    |      | 15       | 本劑追加試驗時加展著劑 70%加收活展 2,000 倍。 |    |
| 十字花科包葉菜類 | 苗立枯病 | 2.27 公升/10 平方公尺 | 1,100 | 苗床播種後施藥。              | 10      | 2    |      | 15       |                              |    |
| 旋花科小葉菜類  | 根腐病  | 2.5 公升          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                              |    |
| 豆科小葉菜類   | 立枯病  | 2.5 公升          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                              |    |
| 豆科小葉菜類   | 苗立枯病 | 2.5 公升          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                              |    |
| 十字花科小葉菜類 | 苗立枯病 | 2.27 公升/10 平方公尺 | 1,100 | 苗床播種後施藥。              | 10      | 2    |      | 15       |                              |    |
| 菊科小葉菜類   | 立枯病  | 2.5 公升          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                              |    |
| 茄科小葉菜類   | 苗立枯病 | 2.5 公升          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病          |         |      |      | 15       |                              |    |

| 作物<br>名稱                                      | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                    | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------|-----------|
|                                               |          |                    |          | 斑時澆灌<br>1 次。                            |                 |          |          |                  |            |           |
| 蔥科小<br>葉菜類                                    | 立枯病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 葫蘆科<br>小葉菜<br>類                               | 立枯病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 繖形花<br>科小葉<br>菜類                              | 莖腐病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 莧科小<br>葉菜類                                    | 葉枯病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 百慕達<br>草                                      | 褐斑病      | 1 公升               | 1,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。                     | 14              | 3        |          |                  |            |           |
| 大豆                                            | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  | 適用於毛<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、 | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |

| 作物<br>名稱                                           | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                        | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項 | 說明        |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|-----------|
| 樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆                                   |          |                    |          |                                             |                 |          |          |                  |      |           |
| 番茄、<br>甜椒、<br>茄子、<br>辣椒、<br>枸杞、<br>香瓜<br>茄、樹<br>番茄 | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |
| 瓜菜類                                                | 苗立枯<br>病 | 0.8-2<br>公升        | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |
| 馬鈴薯                                                | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>升 | 1,000    | 薯塊定植<br>後澆灌 1<br>次，隔<br>10 天再<br>施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |

25 (%) (w/w) 賓克隆 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量         | 稀釋倍數  | 使用時期                  | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                        | 說明 |
|----------|------|-----------------|-------|-----------------------|---------|------|------|----------|-----------------------------|----|
| 水稻       | 紋枯病  | 0.5 公斤          | 2,000 | 病害發生初期開始施藥。           | 14      | 2    |      | 15       | 本劑追加試驗時加展著劑 70%加收活展 2,000 倍 |    |
| 十字花科包葉菜類 | 苗立枯病 | 2.27 公斤/10 平方公尺 | 1,100 | 苗床播種後施藥。              | 10      | 2    |      | 15       |                             |    |
| 旋花科小葉菜類  | 根腐病  | 2.5 公斤          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                             |    |
| 豆科小葉菜類   | 立枯病  | 2.5 公斤          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                             |    |
| 豆科小葉菜類   | 苗立枯病 | 2.5 公斤          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                             |    |
| 十字花科小葉菜類 | 苗立枯病 | 2.27 公斤/10 平方公尺 | 1,100 | 苗床播種後施藥。              | 10      | 2    |      | 15       |                             |    |
| 菊科小葉菜類   | 立枯病  | 2.5 公斤          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌 1 次。 |         |      |      | 15       |                             |    |
| 茄科小葉菜類   | 苗立枯病 | 2.5 公斤          | 1,000 | 苗床播種後，或幼苗出現病          |         |      |      | 15       |                             |    |

| 作物<br>名稱                                      | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                    | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項       | 說明        |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------|-----------|
|                                               |          |                    |          | 斑時澆灌<br>1 次。                            |                 |          |          |                  |            |           |
| 蔥科小<br>葉菜類                                    | 立枯病      | 2.5 公<br>斤         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 葫蘆科<br>小葉菜<br>類                               | 立枯病      | 2.5 公<br>斤         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 繖形花<br>科小葉<br>菜類                              | 莖腐病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 莧科小<br>葉菜類                                    | 葉枯病      | 2.5 公<br>升         | 1,000    | 苗床播種<br>後，或幼<br>苗出現病<br>斑時澆灌<br>1 次。    |                 |          |          | 15               |            |           |
| 百慕達<br>草                                      | 褐斑病      | 1 公斤               | 1,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥                      | 14              | 3        |          |                  |            |           |
| 大豆                                            | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>斤 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  | 適用於毛<br>豆。 | 本項新<br>增。 |
| 刀豆、<br>花豆、<br>扁豆、<br>豇豆、<br>菜豆、<br>菜豆、<br>豌豆、 | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>斤 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  | 適用於鮮<br>豆。 | 本項新<br>增。 |




| 作物<br>名稱                                           | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                                        | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項 | 說明        |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|-----------|
| 樹豆、<br>翼豆、<br>蠶豆                                   |          |                    |          |                                             |                 |          |          |                  |      |           |
| 番茄、<br>甜椒、<br>茄子、<br>辣椒、<br>枸杞、<br>香瓜<br>茄、樹<br>番茄 | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>斤 | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |
| 瓜菜類                                                | 苗立枯<br>病 | 0.8-2<br>公斤        | 1,000    | 播種後澆<br>灌 1 次，<br>隔 10 天<br>再施藥 1<br>次。     |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |
| 馬鈴薯                                                | 苗立枯<br>病 | 0.5-<br>1.5 公<br>斤 | 1,000    | 薯塊定植<br>後澆灌 1<br>次，隔<br>10 天再<br>施藥 1<br>次。 |                 | 共 2<br>次 |          |                  |      | 本項新<br>增。 |

檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年4月14日  
發文字號：農授防字第1111488629D號



主旨：公告修正「賽座滅」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

## 「賽座滅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 14 日農授防字第 1111488629D 號公告修正

9.4 (%) (w/w) 賽座滅 水懸劑 (SC)

| 作物<br>名稱                | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法                            | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                         | 說明 |
|-------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----|
| 水稻                      | 立枯病      | 0.5 公<br>撮/箱       | 1,000    | 播種後施<br>藥。          |                 |          | 播種後<br>隨即灌<br>注藥<br>液，再<br>行覆<br>土。 |                  | 限育苗箱使<br>用。                                  |    |
| 十字花<br>科包葉<br>菜類        | 露菌病      | 0.4 公<br>升         | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 3        |                                     | 15               | 包葉菜類採<br>收前 15 天<br>(設施栽培<br>21 天) 停<br>止施藥。 |    |
| 結球萵<br>苣                | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |                                     | 15               | 設施栽培<br>21 天停止<br>施藥。                        |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類        | 露菌病      | 0.4 公<br>升         | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 3        |                                     | 9                | 採收前 9 天<br>(設施栽培<br>15 天) 停<br>止施藥。          |    |
| 不結球<br>萵苣與<br>半結球<br>萵苣 | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |                                     | 9                | 設施栽培<br>15 天停止<br>施藥。                        |    |
| 茼蒿                      | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |                                     | 9                | 設施栽培<br>15 天停止<br>施藥。                        |    |
| 山茼蒿                     | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |                                     | 9                | 設施栽培<br>15 天停止<br>施藥。                        |    |
| 紅鳳菜                     | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |                                     | 9                | 設施栽培<br>15 天停止<br>施藥。                        |    |
| 白鳳菜                     | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公      | 3,000    | 病害發生<br>初期開始        | 7               |          |                                     | 9                | 設施栽培<br>15 天停止                               |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量    | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數        | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                  | 說明          |
|----------|----------|--------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|          |          | 升                  |          | 施藥。                 |                 |                 |          |                  | 施藥。                                                   |             |
| 龍葵       | 疫病       | 0.2-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 9                |                                                       |             |
| 蔥        | 疫病       | 0.6-<br>1.0 公<br>升 | 2,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 最多<br>連續<br>3 次 |          | 9                |                                                       |             |
| 龍鬚菜      | 疫病       | 0.3-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 9                |                                                       | 本 項 修<br>正。 |
| 芹菜       | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 9                | 設施栽培<br>15 天停止<br>施藥。                                 |             |
| 牛蒡       | 疫病       | 0.1-<br>0.3 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 14               |                                                       |             |
| 胡蘿蔔      | 疫病       | 0.1-1<br>公升        | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 14               |                                                       |             |
| 番茄       | 晚疫病      | 0.2-<br>0.4 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4               |          | 6                |                                                       |             |
| 甜椒       | 疫病       | 0.2-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 6                |                                                       |             |
| 辣椒       | 疫病       | 0.2-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 6                |                                                       |             |
| 枸杞       | 疫病       | 0.2-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 6                | 果菜類作物<br>採收前 6 天<br>停止施藥。<br>小葉菜類採<br>收前 9 天停<br>止施藥。 |             |
| 香瓜茄      | 疫病       | 0.2-<br>0.5 公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |                 |          | 6                |                                                       |             |

| 作物名稱                  | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用量                  | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項 | 說明                                              |
|-----------------------|------|------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|-------------------------------------------------|
| 野茄                    | 疫病   | <del>0.2-</del><br>0.5公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 6                |      | 查 未 訂<br>有 農 藥<br>殘 留 容<br>許 量 標<br>準，本項<br>刪除。 |
| 洛神葵                   | 疫病   | 0.1-<br>0.7公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 6                |      |                                                 |
| 秋葵                    | 疫病   | 0.1-<br>0.7公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 6                |      |                                                 |
| 瓜菜類                   | 露菌病  | <del>0.3-</del><br>0.5公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 3                |      | 重 複 範<br>圍，本項<br>刪除。                            |
| 瓜菜類                   | 露菌病  | 0.3-<br>0.5公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 3                |      |                                                 |
| 瓜菜類                   | 疫病   | 0.3-<br>0.5公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 3                |      |                                                 |
| 胡瓜                    | 露菌病  | 0.3-<br>0.5公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 3                |      |                                                 |
| 西瓜、<br>洋香<br>瓜、香<br>瓜 | 露菌病  | 0.2-<br>0.4公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 6                |      | 本 項 修<br>正。                                     |
| 瓜果類                   | 露菌病  | <del>0.3-</del><br>0.5公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 6                |      | 重 複 範<br>圍，本項<br>刪除。                            |
| 瓜果類                   | 露菌病  | <del>0.2-</del><br>0.4公<br>升 | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 6                |      | 重 複 範<br>圍，本項<br>刪除。                            |
| 西瓜、<br>洋香<br>瓜、香      | 疫病   | 0.3-<br>0.5公<br>升            | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 6                |      | 本 項 修<br>正。                                     |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數      | 施藥<br>方法                                                      | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                          | 說明        |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| 瓜        |          |                      |          |                     |                 |               |                                                               |                  |                               |           |
| 木瓜       | 疫病       |                      | 2,000    | 雨季來臨<br>前施藥。        | 7-10            | 6             |                                                               | 12               | 為預防性藥<br>劑，宜於發<br>病前開始施<br>藥。 |           |
| 百香果      | 疫病       | 0.4-<br>0.8 公<br>升   | 2,000    | 雨季來臨<br>前開始施<br>藥。  | 7-10            | 共 3<br>次      |                                                               | 12               |                               |           |
| 草莓       | 果腐病      | 0.3-<br>0.4 公<br>升   | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |               |                                                               | 6                | 採果期避免<br>施藥。                  |           |
| 葡萄       | 露菌病      |                      | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4             |                                                               | 6                |                               |           |
| 蓮霧       | 疫病       |                      | 3,000    | 開花盛期<br>施藥。         | 7               | 至套<br>袋       | 開花盛<br>期開始<br>施藥，<br>以後每<br>隔 7 天<br>施藥一<br>次，至<br>套袋前<br>為止。 | 9                |                               |           |
| 番石榴      | 疫病       | 0.4-<br>0.67 公<br>升  | 3,000    | 小果期施<br>藥。          | 7               |               |                                                               | 9                |                               |           |
| 無花果      | 白腐病      | 0.27-<br>0.53 公<br>升 | 3,000    | 小果期施<br>藥。          | 7               |               |                                                               | 9                |                               |           |
| 莧菜       | 疫病       | 0.1 -<br>0.3 公<br>升  | 3,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 共<br>1-2<br>次 |                                                               | 9                |                               | 本項新<br>增。 |