

「滅芬農」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 3 日農授防字第 1111488749A 號公告

42.37 (%) 滅芬農 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
冬瓜、南瓜、扁蒲、苦 瓜、夏南瓜、隼人 瓜、絲 瓜、越瓜	白粉 病	0.25 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>3</u>	本藥劑使 用範圍： 瓜菜類(胡 瓜除外)。	本項修正。
洋香瓜、 香瓜、西 瓜	白粉 病	0.25 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7	3		6		本項修正。
葡萄	白粉 病	0.3 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	10	3		21		
薔薇科梨 果類	白粉 病	0.1-0.6 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7			14		
鼠李科梨 果類	白粉 病	0.2-0.3 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7			14		
鼠李科梨 果類	白粉 病	0.2-0.3 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7			14		重複範圍， 本項刪除。
柿	白粉 病	0.3-0.4 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7			14		
花木	白粉 病	0.2-0.6 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥。	7				限觀賞花 卉使用， 使用前宜 先進行小 面積藥害 測試。	
胡瓜	白粉 病	<u>0.25 公升</u>	<u>4,000</u>	<u>病害發生初期</u> <u>開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>3</u>		本項新增。
木鱉果	白粉 病	<u>0.25 公升</u>	<u>4,000</u>	<u>病害發生初期</u> <u>開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>3</u>		本項新增。