

「三元硫酸銅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 26 日農授防字第 1111488940B 號公告修正

27.12 (%) (w/w) 三元硫酸銅 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	葉部細 菌性病 害	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
豌豆	葉部細 菌性病 害	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次			適用於葉 用豌豆。	本項修正。
枸杞	細菌性 斑點病	1-3 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次			適用於枸 杞葉。	
蔥	疫病	2.4-4 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	2				
蔥	細菌性 軟腐病	2.4-4 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	2				
豆薯	葉部細 菌性病 害	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
狗尾草	葉部細 菌性病 害	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
闊葉大 豆	葉部細 菌性病 害	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
馬鈴薯	細菌性 斑點病	1-3 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
芋	疫病	1.2 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	2				
茄科果 菜類	細菌性 斑點病	1-4 公 升	500	病害發生 初期開始	7	3				重複範圍， 本項刪除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				施藥						
茄科果 菜類	細菌性 斑點病	1-3 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
甜椒	細菌性 斑點病	2-3 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	3				
瓜菜類	露菌病	1.5 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3				
豆菜類	葉部細 菌性病 害	1.7 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
瓜果類	露菌病	1.5 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3				
木瓜	果疫病	0.6-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
鳳梨	心腐病	1.3-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
番荔枝	果疫病	0.9-1.9 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
酪梨	疫病	1.3-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
百香果	疫病	1-2 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
紅毛丹	果疫病	0.8-1.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
葡萄	黑痘病	1.5 公 升	800	新芽萌發 果穗形成 後施藥。	7	5-7			新芽未萌 發前施藥 一次。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蓮霧	疫病		800	病害發生 初期開始 施藥。	7	5				
番石榴	疫病	1.5-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7				施藥至套 袋前為 止。	
無花果	白腐病	1.0-2.0 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7					
荔枝	露疫病	0.8-1.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
檬果	果疫病	1.1-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
檬果	細菌性 黑斑病	2-2.4 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	5			試驗時加 展 著 劑 「 日 展 寶 」 2,000 倍。	
鼠李科 梨果類	疫病	1-1.5 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7					
柑桔類	疫病		800	病害發生 初期開始 施藥。	14	3				
柑桔類	潰瘍病	2-4.8 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				
菊	疫病		500	病害發生 初期開始 施藥。	14	4	每株灌 藥液 200 公撮。			
野薑	疫病	2-5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7					
嘉德麗 雅蘭	疫病	2-5 公 升	500	病害發生 初期開始	7				限觀賞植 物使用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
黃耆	<u>葉部細菌性病</u> <u>害</u>	1-1.5 公 升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
可可	果疫病	1.1-2.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 5 次				

23 (%) (w/w) 三元硫酸銅 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
菜豆	<u>葉部細菌性病</u> <u>害</u>	2 公升	500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。 原始登記 廠商名稱： 日佳農藥 股份有限公司。