

限制 22.5%陶斯松乳劑等十種農藥之使用方法及其 範圍草案

主 旨：預告訂定「限制 22.5%陶斯松乳劑等十種農藥
之使用方法及其範圍」。

依 據：農藥管理法第十八條第一項。

公告事項：自中華民國一百十一年六月二十日起限制下列
農藥於作物之使用方法及範圍(如附件)：

- 一、限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於獼猴桃、
百香果、草莓、楊桃、桑樹、菊(食用作物)。
- 二、限制「40.8%陶斯松乳劑」及「40.8%陶斯松水基
乳劑」不得使用於黃金果、香蕉、鳳梨、獼猴桃、
紅龍果、百香果、榴槤蜜、草莓、楊桃、桑樹、
椰子、菊(食用作物)、百合、蓮(食用作物)、玫
瑰(食用作物)。
- 三、限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於綠豆、獼
猴桃、百香果、草莓、楊桃、桑樹、菊(食用作
物)。
- 四、限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼
性粉劑」不得使用於獼猴桃、百香果、草莓、楊

桃、蓮霧、番石榴、桑樹、諾麗果、菊(食用作物)。

五、限制「10%陶斯松燻煙劑」不得使用於穀倉。

六、限制「5%陶斯松粒劑」不得使用於禾本科雜糧類、玉米、菊(食用作物)。

七、限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得使用於黃金果、榴槤蜜、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、諾麗果、菊(食用作物)。

八、限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於獼猴桃、百香果、草莓、楊桃、桑樹、菊(食用作物)。

附件、陶斯松農藥使用方法及其範圍

2.500(%) 陶斯松 粉劑 (DP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	蟻 螞 害 蟲	50 公斤 (防治地下害蟲)		六一七月間施藥。				21	單株用藥量5公克;限幼木(1-3年生)使用;施藥時將樹幹下表土向左右耙開各15CM寬,深10CM之條溝,將規定藥量加適量細砂混勻撒佈後覆土。	

22.500(%) 陶斯松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
油茶	夜蛾類	1-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	1-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
獼猴桃	夜蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於獼猴

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										桃，爰本項刪除。
酪梨	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
百香果	夜蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
百香果	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	1.1-2.9 公升	700	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										除。
桑樹	夜蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
花木	盾介殼蟲類	1.2-5公升	500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	切根蟲	1.5公升	700	定植後於畦面施藥1次。	10			14		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
菊	蚜蟲類	0.2-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「22.5%陶斯松乳劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
臺灣欒樹	椿象類	0.6-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
鐘麻	小造橋蟲	1.5公升	700	害蟲發生時開始施						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
咖啡	夜蛾類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.9-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

40.800(%) 陶斯松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
油茶	夜蛾類	0.6-1.7公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	0.6-1.7公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
黃金果	粉介殼蟲類	0.6-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於黃金果，爰本項刪除。
香蕉	粉介殼蟲類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										用於香蕉，爰本項刪除。
香蕉	假莖象鼻蟲	0.27 公升	1,000					30	每株注射 150 公撮可兼防治幼蟲;不得注入假莖中央三分之一部分;應由技術人員現場指導方可使用。	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得用於香蕉，爰本項刪除。
鳳梨	粉介殼蟲類	1.8 公升	2,000	定植後 1 個月左右實施第一次灌藥。				9	1.定植後 1 個月左右實施第一次灌藥，每株自心部灌入 100 公撮，以後每隔 3 個月灌藥一次，連續灌藥 3 次。	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得用於鳳梨，爰本項刪除。
獼猴桃	夜蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得用於獼猴桃，爰本項刪除。
番荔枝	粉介殼蟲類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
酪梨	夜蛾類	0.6-1.1公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	0.6-1.1公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	粉介殼蟲類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		
紅龍果	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於紅龍果，爰本項刪除。
百香果	夜蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
百香果	毒蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
榴槿蜜	粉介殼蟲類	0.7-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於榴槿蜜，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於草莓，

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
桑樹	夜蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
椰子	金花蟲類		1,000	害蟲發生時開始施藥。	60			5	以高壓動力噴霧機噴於心葉處，已展開葉片不必噴施；應加展著劑(高展)以增藥效；其他椰子扁金花蟲亦可用同法防治；魚塭週	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於椰子，爰本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									圍避免使用。	
花木	盾介殼蟲類	0.6-2.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	根切蟲	1.2公升	1,000	定植後於畦面施藥1次。	10			14		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
菊	蚜蟲	0.2-0.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
蘇鐵	盾介殼蟲類		1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-12	2			4月時若蟲密度上升為施藥適期應噴及全株，用水量須足夠。	
百合	蚜蟲類	0.7-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限食用花苞品種使用。	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於百合，爰本項刪除。
百合	花薊馬類	0.7-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限食用花苞品種使用。	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於百合，

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										爰本項刪除。
蓮	蚜蟲類	0.8-1.2公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限開花前使用。	限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於蓮(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
玫瑰	蚜蟲類		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10				適用於觀賞花卉。	
玫瑰	盾介殼蟲類	1-2.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「40.8%陶斯松乳劑」不得使用於玫瑰(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
玫瑰	花薊馬		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10				薊馬發生時應噴及花部。適用於觀賞花卉。	
臺灣欒樹	椿象類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
山茶	盾介殼蟲類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21	若蟲發生時(四月、六月、八月、十月)防治,但對成蟲效果不好	
木麻黃	木麻黃星天牛		200	四-五月間害蟲發生時開始施藥。					施藥位置:自地面起至一公尺之樹幹均勻噴藥	
茶	茶蠶	0.75公	1,500	害蟲發生				21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		時開始施藥。						
鐘麻	小造橋蟲	1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
咖啡	夜蛾類	0.4-0.8 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.4-0.8 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.5-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。		1			施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

40.800(%) 陶斯松 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
油茶	夜蛾類	0.6-1.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	0.6-1.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
黃金果	粉介殼	0.6-1.3	1,500	害蟲發生	7			12		限制「40.8%

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	蟲類	公升		時開始施藥。						陶斯松水基乳劑」不得用於黃金果，爰本項刪除。
香蕉	粉介殼蟲類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於香蕉，爰本項刪除。
香蕉	假莖象鼻蟲	0.27公升	1,000					30	每株注射150公撮可兼防治幼蟲;不得注入假莖中央三分之一部分;應由技術人員現場指導方可使用。	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於香蕉，爰本項刪除。
鳳梨	粉介殼蟲類	1.8公升	2,000	定植後1個月施藥。	90	3			定植後1個月左右實施第一次灌藥，每株自心部灌入100公撮，以後每隔3個月灌藥一次，繼續灌藥三次	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於鳳梨，爰本項刪除。
獼猴桃	夜蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.4-0.9	1,800	害蟲發生	7			15		限制「40.8%

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						陶斯松水基乳劑」不得用於獼猴桃，爰本項刪除。
番荔枝	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		
酪梨	夜蛾類	0.6-1.1公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	0.6-1.1公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	粉介殼蟲類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		
紅龍果	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			15		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於紅龍果，爰本項刪除。
百香果	夜蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於百香果，爰本項刪除。
百香果	毒蛾類	0.4-0.9公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於百香果，爰本項刪除。
榴槤蜜	粉介殼蟲類	0.7-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松水基

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						乳劑」不得用於榴槿蜜，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於楊桃，爰本項刪除。
桑樹	夜蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.4-0.9 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於桑樹，爰本項刪除。
椰子	金花蟲類		1,000	害蟲發生時開始施藥。	60			5	以高壓動力噴霧機噴於心葉處，已	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									展開葉片不必噴施；應加展著劑(高展)以增藥效；其他椰子扁金花蟲亦可用同法防治；魚塭週圍避免使用。	使用於椰子，爰本項刪除。
花木	盾介殼蟲類	0.6-2.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	根切蟲	1.2公升	1,000	定植後於畦面施藥1次。	10			14		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
蘇鐵	盾介殼蟲類		1,000	害蟲發生時開始施藥。	7-12	2			4月時若蟲密度上升為施藥適期應噴及全株，用水量須足夠。	
百合	蚜蟲類	0.7-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限食用花苞品種使用。	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得用於百合，爰本項刪除。
百合	花薊馬類	0.7-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限食用花苞品種使用。	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										使用於百合，爰本項刪除。
蓮	蚜蟲類	0.8-1.2公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10			6	限開花前使用。	限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得使用於蓮(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
玫瑰	蚜蟲類		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10				適用於觀賞花卉。	
玫瑰	盾介殼蟲類	1-2.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「40.8%陶斯松水基乳劑」不得使用於玫瑰(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
玫瑰	花薊馬		1,500	害蟲發生時開始施藥。	10				薊馬發生時應噴及花部。適用於觀賞花卉。	
臺灣欒樹	椿象類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
山茶	盾介殼蟲類	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21	若蟲發生時(四月、六月、八月、十月)防治,但對成蟲效果不好	
木麻黃	木麻黃星天牛		200	四-五月間害蟲發生時開始					施藥位置:自地面起至一公尺之樹幹	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。					均勻噴藥	
茶	茶蠶	0.75 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。				21		
鐘麻	小造橋蟲	1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
咖啡	夜蛾類	0.4-0.8 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.4-0.8 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.5-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			35		

44.900 (%) 陶斯松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	夜蛾類	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	10	2		21		
綠豆	夜蛾類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得用於綠豆，爰本項刪除。
綠豆	毒蛾類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得用於綠豆，

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										爰本項刪除。
紅豆	螟蛾類	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
紅豆	夜蛾類	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	夜蛾類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
獼猴桃	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
酪梨	夜蛾類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
百香果	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										刪除。
百香果	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	0.8-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
桑樹	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
花木	盾介殼蟲類	0.6-2.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	蚜蟲類	0.2-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「44.9%陶斯松乳劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
臺灣樂樹	椿象類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
咖啡	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		

50.000(%) 陶斯松 水基乳劑 (EW) 及可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
油茶	夜蛾類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
獼猴桃	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
酪梨	夜蛾類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	薊馬類	0.8-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。		1		9		
百香果	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
百香果	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「50%陶斯松水基乳

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	0.7-1.7公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於楊桃，爰本項

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										刪除。
楊桃	薊馬類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得用於楊桃，爰本項刪除。
蓮霧	粉介殼蟲類	0.5-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得用於蓮霧，爰本項刪除。
蓮霧	腹鈎薊馬	1-2公升	2,000	薊馬發生時施藥1次。				12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得用於蓮霧，爰本項刪除。
番石榴	粉介殼蟲類	0.8公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7-10	2		6		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得用於番石榴，爰本項刪除。
番石榴	薊馬類	0.6-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										性粉劑」不得使用於番石榴，爰本項刪除。
桑樹	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於桑樹，爰本項刪除。
諾麗果	粉介殼蟲類	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於諾麗果，爰本項刪除。
花木	盾介殼蟲類	0.5-2.1公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	蚜蟲類	0.1-0.5公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「50%陶斯松水基乳劑」及「50%陶斯松可溼

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										性粉劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
臺灣樂樹	椿象類	0.3-0.8公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
咖啡	夜蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		

10.000 (%) 陶斯松 燻煙劑 (FU)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
穀倉	積穀害蟲	0.5公升/每百立方公尺		空倉消毒時。				7	密閉薰蒸2天。用於袋裝稻穀,於施藥一週後始可出倉。	限制「10%陶斯松燻煙劑」不得用於穀倉，爰本項刪除。

5.000 (%) 陶斯松 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
禾本科雜糧類	切根蟲	20 公斤		定植前 3 天施藥。			在畦上撒佈一次，並以鐵耙拌土約 5 公分，定植後一週再施藥一次		限定植前及定植後一週使用	限制「5%陶斯松粒劑」不得使用於禾本科雜糧類，爰本項刪除。
玉米	玉米螟	20 公斤		抽穗前施藥。				54	生育初期如發生玉米螟，將藥粒施於心葉一次；雄花抽穗前 10-15 天再將藥粒施於心葉一次；每株用藥 0.3-0.5 公克。	限制「5%陶斯松粒劑」不得使用於玉米，爰本項刪除。
香蕉	球莖象鼻蟲	30G/每株		害蟲發生時開始施藥。						
香蕉	花薊馬			花苞抽出莖頂 5 日內施藥 1 次。		1			於第一、二葉鞘內各放置 7.5 克。風雨日停止施藥。	
菊	切根蟲	30 公斤		定植前 3 天施藥 1 次。			將藥劑拌入土中 5 公分	14		限制「5%陶斯松粒劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
百慕達草	蟻螞害蟲	15 公斤		發現害蟲土堆時開始施藥。					發現害蟲土堆時將藥劑均勻撒施於草皮上，並	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									立即灌水。	

75.000 (%) 陶斯松 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
黃金果	粉介殼蟲類	0.3-0.7公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得用於黃金果，爰本項刪除。
番荔枝	粉介殼蟲類	0.3-0.5公升	3000	害蟲發生時開始施藥。	10	2		12		
榴槿蜜	粉介殼蟲類	0.3-0.7公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得用於榴槿蜜，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	0.4-1.1公升	1,800	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	粉介殼蟲類	0.3-0.5公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得用於楊桃，爰本項刪除。
蓮霧	粉介殼蟲類	0.3-1公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得用於蓮

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										霧，爰本項刪除。
番石榴	粉介殼蟲類	0.3-1 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。				12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得使用於番石榴，爰本項刪除。
諾麗果	粉介殼蟲類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			12		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得使用於諾麗果，爰本項刪除。
花木	盾介殼蟲類	0.3-1.3 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	蚜蟲類	0.1-0.3 公升	3,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「75%陶斯松水分散性粒劑」不得使用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
臺灣欒樹	椿象類	0.2-0.4 公升	3,500	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
咖啡	粉介殼蟲類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
蘭科作物	檢疫			檢疫處理		1			施藥量及稀	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
物	處理			時施藥 1 次。					釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

25.000(%) 陶斯松 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
油茶	夜蛾類	1-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
油茶	毒蛾類	1-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
獼猴桃	夜蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
獼猴桃	毒蛾類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於獼猴桃，爰本項刪除。
酪梨	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
酪梨	毒蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
百香果	夜蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
百香果	毒蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於百香果，爰本項刪除。
草莓	夜蛾類	1.1-2.9公升	700	害蟲發生時開始施藥。	7			6		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於草莓，爰本項刪除。
楊桃	夜蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
楊桃	毒蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用於楊桃，爰本項刪除。
桑樹	夜蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得使用

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										於桑樹，爰本項刪除。
桑樹	毒蛾類	0.8-1.6公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得用於桑樹，爰本項刪除。
花木	盾介殼蟲類	1.2-5公升	500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	蚜蟲類	0.2-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14		限制「25%陶斯松可溼性粉劑」不得用於菊(食用作物)，爰本項限觀賞花卉使用。
臺灣樂樹	椿象類	0.6-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				避免於開花期使用。	
咖啡	夜蛾類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	毒蛾類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
咖啡	粉介殼蟲類	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		
可可	粉介殼蟲類	0.9-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			35		