

馬鈴薯番茄潛旋蛾緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
2.4%第滅寧 SC (deltamethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時 施藥 1 次	採收前 6 天停止施藥。
2.8%第滅寧 EC (deltamethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時 施藥 1 次。	採收前 6 天停止施藥。
2.8%第滅寧 EW (deltamethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時 施藥 1 次。	採收前 6 天停止施藥。
20%亞滅培 SP (acetamiprid)	0.1-0.3 公斤	6,000	害蟲發生時 開始施藥， 間隔 7 天再 施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 6 天停止施藥。
2.5%賜諾殺 SC (spinosad)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時 開始施藥， 間隔 7 天再 施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停止施藥。
11.6%賜諾殺 SC (spinosad)	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生時 開始施藥， 間隔 7 天再 施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停止施藥。
80%賜諾殺 WP (spinosad)	0.01-0.05 公升	32,000	害蟲發生時 開始施藥， 間隔 7 天再 施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
2%阿巴汀 EC (abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 12 天停止施藥。
2%阿巴汀 EW (abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 12 天停止施藥。
2.15%因滅汀 EC (emamectin benzoate)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 14 天停止施藥。
2.15%因滅汀 EW (emamectin benzoate)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 14 天停止施藥。
2.15%因滅汀 SC (emamectin benzoate)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 14 天停止施藥。
5%因滅汀 SG (emamectin benzoate)	0.1-0.4 公 斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，間隔 7 天再施藥 1 次，共 2 次。	採收前 14 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
19.2 G/L (1.92% W/V) 因滅汀 EC (emamectin benzoate)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 14 天 停止施藥。
10% 克凡派 SC (chlorfenapyr)	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	採收前 3 天停 止施藥。
54% (32,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 WG (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351)	0.6-1.0 公 斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	
48.1% (35,000 DBMU/MG) 鮎澤蘇力 菌 ABTS-1857 WG (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857)	0.9-1.5 公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	
54% (15,000 IU/MG) 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain NB-200)	0.9-1.5 公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 間隔 7 天再施藥 1 次， 共 2 次。	