

「庫斯蘇力菌 ABTS-351」農藥使用方法及其範圍

2.3% (1,600 IU/MG) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
玉米	玉米螟	5 公斤		輪生 初、中 期；雄 花抽穗 前；雌 花吐絲 後施 藥。			將藥 粒平 均施 於心 葉。		輪生初、中 期；雄花抽穗 前 4-5 天；雌花 吐絲後 3-4 天，各施藥一 次。	

23.7% (16,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 WP 可溼性粉劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花科 包葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 包葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 包葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 包葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 包葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 小葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 小葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施	10					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
十字花科 小葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 小葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 小葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 根菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 根菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
茶	茶蠶	0.5 公斤	2,000						1. 盡量在幼 齡時期施 藥。 2. 發生茶叢 行局部施 藥。	
玉米	玉米螟	1.6-2 公 斤	600	輪生期施 藥。					雄花抽穗,吐絲 初,吐絲後及全 吐絲後 5 天各 一次,展著劑 YAMATO3000	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									倍。	

54% (32,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 WG 水分散性粒劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花科 包葉菜類	紋白蝶	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
十字花科 小葉菜類	紋白蝶	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
十字花科 根菜類	紋白蝶	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
蔬菜	鱗翅目 害蟲	0.5-0.75 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥	7					本項新 增。
茶、 油茶、 山茶	鱗翅目 害蟲	0.5 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥	7					本項新 增。