

「鮎澤蘇力菌 ABTS-1857」農藥使用方法及其範圍

10.8% (7,000 DBMU/MG) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 SC 水懸劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	0.8-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					

48.1% (35,000 DBMU/MG) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 WG 水分散性粒劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔥	夜蛾類	1-1.5 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菠菜	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
草莓	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菊	夜蛾類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
野薑	夜蛾類	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
蓮	夜蛾類	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
甘藍	小菜蛾	0.25-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				本劑試驗時加 著劑自然油 1,500 倍	
十字花科	鱗翅目	1-1.2 公	1,000	害蟲發生						本項新

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
<u>包葉菜</u> 類、 <u>十字花科</u> <u>小葉菜</u> 類、 <u>十字花科</u> <u>根菜類</u>	害蟲	斤		<u>時開始施</u> <u>藥。</u>						增。
<u>茄科小葉</u> 菜類、 <u>茄科根菜</u> 類、 <u>茄科果菜</u> 類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	<u>害蟲發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>						本項新 增。
<u>豆科乾豆</u> 類、 <u>豆科小葉</u> 菜類、 <u>豆科根菜</u> 類、 <u>豆菜類</u>	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	<u>害蟲發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>						本項新 增。
<u>茶、</u> <u>油茶、</u> <u>山茶</u>	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	<u>害蟲發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>						本項新 增。
<u>茶</u>	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	<u>害蟲發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>					<u>適用於茶籽。</u>	本項新 增。